

اندوسکوپي:

از طريق اندوسکوپي پزشک مي تواند مري، معده و دوازدهه (اثنی عشر) شما را به وضوح ببيند.

اين تست براي افراڊي استفاده مي شود که:

- دچار سوزش سر معده، درد شکم و خونريزي غير طبيعي هستند.

- تشخيص زخم، پليپ و توده هاي دستگاه گوارش فوقاني


- گاهي از اين تست در مواردی که غذا يا جسم خارجي در مري گیر کرده باشد استفاده مي شود.

- در موارد کنترل خونريزي و برداشتن پليپ نيز استفاده مي شود.

روش انجام اندوسکوپي:

روش انجام اين فرآيند بصورتي است که یک لوله قابل انعطاف (مجهز به منبع نور و گیرنده ويدئويي) را از طريق دهان وارد دستگاه گوارش مي کنند. علاوه بر مشاهده داخلي دستگاه گوارش توسط اين روش، امکان نمونه برداري از مخاط نيز وجود دارد. اين آزمايش حدودا ۳۰ دقيقه به طول خواهد انجاميد.

آندوسکوپي معده و قسمت فوقاني دستگاه گوارش



آمادگي هاي قبل از اندوسکوپي:

- از ۸ ساعت قبل از خوردن و آشاميدن پرهيز کنيد (به استثنا داروهاي تجويز شده توسط پزشک).

- در موارد اورژانس محتويات معده توسط دستگاه مکنده (ساکشن) تخليه خواهد شد.

- در صورت مصرف داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين، آسپرین و پلاويکس پزشک خود را مطلع نماييد.

- دندان مصنوعي را قبل از انجام فرآيند از دهان خارج گردد.

- مدارک پزشکي شامل اندوسکوپي هاي قبلي و جواب آزمايشات خود را همراه داشته باشيد.

مراحل حين اندوسکوپي:

- ابتدا شما روي تخت دراز خواهيد کشيد. در صورتي که نياز به تزريق داروهاي آرامبخش احساس شود، پرستار براي شما یک راه وريدي باز مي کند (رگ مي گيرد) و آن را به سرم وصل مي کند و داروي آرامبخش از طريق سرم به شما تزريق مي شود، البته اغلب موارد اندوسکوپي بدون نياز به تزريق داروهاي آرامبخش انجام مي شود.

- در مرحله بعد داروي بي حسي به درون حلق شما اسپري خواهد شد اين دارو مزه بدی دارد و ممکن است احساس بي حسي و تورم در حلق داشته باشيد. داروي بي حسي توانايي بلعيدن (قورت دادن) را از بين خواهد برد.

- مطمئن باشيد در حين انجام آزمايش تنفس شما دچار مشکل نخواهد شد.

- با قرار دادن یک محافظ در دهان از دندانهاي شما محافظت خواهد شد.

- به هنگام وارد شدن لوله و انجام معاينه در شکم احساس پري و فشار خواهيد کرد.

- تنفس و فشار خون شما در طی انجام آزمايش تحت نظر خواهد بود.



بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

آندوسکوپی



تهیه و تنظیم:

آرزو رضائی

(ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه)

درمان جایگزین:

به جای این روش می‌توان از عکسبرداری نیز استفاده کرد ولی عکسبرداری فقط جنبه تشخیصی دارد و در درمان نقشی ندارد، ضمناً قدرت تشخیص عکسبرداری کمتر از آندوسکوپی است.

پس از انجام آندوسکوپی ممکن است:

- تا یک ساعت قادر به قورت دادن نیستید. زمانی که توانایی بلعیدن و قورت دادن را بدست آوردید می‌توانید غذا بخورید.

- ممکن است، تا چند روز گلو درد داشته باشید.

- در صورت استفاده از داروی آرام بخش (میدازولام) حین آندوسکوپی تا ۲۴ ساعت از رانندگی و انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری فرمائید.

عوارض و خطرات احتمالی:

در موارد بسیار نادر احتمال بروز خونریزی، آسیب به روده، معده و مری وجود دارد.

