

هدف از قالب گچی بی حرکت کردن قسمتی از

بدن در یک وضعیت خاص است. از قالب گچی

برای بیحرکت کردن استخوان شکسته، بی حرکت کردن شکستگیهای جافتاده، برای جلوگیری از صدمه به نسوج نرم به طور موقت و یا تسکین درد، اصلاح تغییر شکلها یا حمایت از مفاصل ضعیف استفاده میشود.

آموزشهای قبل از گچ گیری:

برای تعیین نوع شکستگی، در رفتگی و یا وجود جسم خارجی نیاز است عکس رادیوگرافی قبل و بعد از جاناندازی انجام گیرد.

قبل از گچ گیری ممکن است نیاز باشد که از آرام بخش، مخدر یا یک داروی بیهوش کننده استفاده گردد.

برای محافظت از پوست و استخوانهای زیر گچ در مقابل تماس مستقیم و فشار قالب گچی، ابتدا عضو مورد نظر را با باند نرم بانداز میکنند.

ممکن است به هنگام گچ گیری صداها و احساسات مختلفی را تجربه کنید، مثل احساس گرما به هنگام سفت شدن گچ که این طبیعی است.

آموزشهای بعد از گچ گیری:

قالب گچی سالم باید خشک، سفت، فاقد شکستگی و یا نرم شدگی و فاقد بو باشد. در حالی که قالب گچی معیوب، مرطوب، خاکستری، کدر، کثیف، خونی، نرم و شکسته و با بوی کپک است و نیاز به تعویض دارد.

تا زمانی که قالب گچی هنوز خشک نشده از قرار دادن آن بر روی سطح سفت یا لبه ی تیز پرهیز کنید.

در حالی که قالب گچی در حال خشک شدن است.

تا حد ممکن آن را کمتر جابجا کنید.

به دلیل اینکه گچ های معمولی در موقع خشک شدن گرم می شوند، لذا توصیه می شود از انداختن پتو یا روانداز بر روی عضو گچ گرفته شده به مدت 24 الی 72 ساعت اجتناب شود.

بهترین کار برای خشک کردن گچ، قرار دادن آن در معرض هوای آزاد است.

برای جلوگیری از تورم اندام داخل گچ، ریه

طور دائمی بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

در صورتیکه قالب گچی شما در اندامهای فوقانی است، می توانید از یک پارچه برای نگهداری و آویزان کردن آن استفاده کنید (پس از اینکه مطمئن شدید که دیگر اندام ورم نمیکند). در صورت استفاده از یخ برای کاهش درد، یخ را در کیسه ی پلاستیکی خشک قرار داده و آن را بر روی وسط گچ و اطراف آن بگذارید.

گچ فایبرگلاس قابل شستشو نیست.

در صورتی که به شما اجازه ی وزن گذاشتن روی گچ داده شده است، توصیه می شود که از راه رفتن روی زمین خیس و لغزنده اجتناب کنید.

قالب گچی را خشک نگه دارید و آن را با پلاستیک یا لاستیک نپوشانید، به هنگام حمام کردن میتوان قالب گچی را با پلاستیک پوشاند.

قالب گچی را تمیز نگه دارید، از بکار بردن رنگ و

لاک یا نظایر آن بر روی گچ خودداری کنید.

از فرو کردن اشیاء تیز و برنده به داخل گچ اجتناب کنید.

از خاراندن پوست زیر قالب گچی خودداری کنید در صورت خارش می توانید با هوای سرد سشوار خارش را برطرف نمایید.

بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

گچ گیری



تهیه و تنظیم :

آرزو رضائی

(ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه)

جهت پیشگیری از یبوست از رژیم پرفیبر (میوه ها و سبزیجات) حاوی سبوس و مایعات فراوان استفاده کنید.

پیشگیری از عفونت و سنگ ادراری:

روزانه 2 الی 3 لیتر مایعات مصرف کنید.
رژیم غنی از کلسیم مثل: لبنیات و کلم مصرف نکنید.
مثانه ی خود را زود به زود تخلیه کنید.

علائم هشدار دهنده:

این موارد را لازم است به پزشک خود گزارش کنید:

ترک برداشتن، سست شدن و یا گشاد شدن بیش از حد قالب گچی. بوی تعفن در اطراف لبه های گچ افزایش تورم اندام گچ گرفته شده و یا احساس سفتی در اندام. سوزن سوزن شدن یا احساس سوزش. درد مقاوم و پیشرونده و یا درد در حالت استراحت که با مصرف مسکن های تجویز شده توسط پزشک برطرف نشود.
ضعف حسی و حرکتی و یا ناتوانی برای حرکت دادن عضلات اطراف قالب گچی.
آبی، قرمز و یا سفید شدن پوست (رنگ پریدگی عضو) سردی انگشتان دست و یا پا که پس از 20 دقیقه پوشاندن، گرم نشوند.

توصیه می شود به طور مداوم عضلات را در داخل گچ منبسط و منقبض کنید تا جریان خون بهبود یافته و از لخته شدن خون و تورم اندام جلوگیری کند و مانع لاغر شدن عضلات داخل گچ شود.
پس از برداشتن گچ، شستشوی عضو با روغن های معدنی و آب به بهبود جریان خون پوست کمک می کند.

روشهای پیشگیری از عوارض قالب گچی:

پیشگیری از عوارض کاهش گردش خون: در وضعیتی قرار گیرید که روی رگهای اصلی عضو فشار وارد نشود.
هر دو ساعت یکبار تغییر وضعیت داده و از خوابیدن روی یک سمت اجتناب کنید.
زمانی که به شما اجازه داده شد، به آرامی شروع به راه رفتن کنید و به تدریج فعالیت بدنی خود را افزایش دهید.
توصیه میشود ورزش را با توجه به دامنه ی حرکتی عضو خود انجام دهید.

پیشگیری از عوارض تنفسی:

با انجام تنفس عمیق و سرفه ترشحات حلق و ریه ی خود را تخلیه کنید.

پیشگیری از عوارض گوارشی: