

خانواده و کرونا ویروس جدید (کووید ۲۰۱۹)

ویرایش ۱

کلیات:

کروناویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که در دهه های اخیر عامل عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی با علائم خفیف تا متوسط و اغلب به صورت سرماخوردگی های معمول بوده اند. نوع جهش یافته و جدید آن به نام COVID19 در انتهای سال میلادی ۲۰۱۹ (ابتدای دیماه ۱۳۹۸) در چین موجب همه گیری که در مواردی با بیماری بسیار شدید و در ۲ تا ۳ درصد از موارد با مرگ همراه بوده است. بیماری از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی به مرور در کشورهای مختلف بروز و شیوع پیدا کرد، به طوریکه در هفته انتهایی سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۰ کشور جهان با این بیماری درگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اولین موارد بیماری در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در قم پیدا و اعلام شد و تا کنون موارد درگیری با بیماری در همه ی استانهای کشور گزارش شده است. انواع دیگری از کرونا ویروس نیز در سالهای اخیر و به شکل محدودتر، بیماریهای شدیدی را که معمولاً محدود به کشور و یا منطقه خاصی بوده است را ایجاد کرده اند که بیماری های بیماری سارس (SARS) یا بیماری مرس (MERS) را ایجاد کرده بود.



علایم بیماری:

شامل تب، سرفه های خشک، تنگی نفس و گاهی مشکلات حاد تنفسیمانند تنفس تند، گلودردو در موارد کمتری آبریزش بینیاست و به طور کمتر شایعی، مشکلات گوارشی نظیر اسهال، نارسایی حاد تنفسی، اختلالات انعقادی خونو نارسایی کلیه‌نیز گزارش شده است شدت علائم بیماری متفاوت استوار و خفیف تاشدید و کشنده مشاهده می‌شود. به طور کلیمی توان گفت که علایم بیماری کروناتاحدودی شبیه به آنفلوانزا و یا سرماخوردگی است.

افراد در معرض خطر:

- سالمندان بالای ۶۰ سال
- افراد دارای بیماری زمئنه ای مثل دلایت، بیماری های قلبی، نقص ایمنی
- خانم های باردار

دوره نهفتگی:

دوره نهفتگی اینوپر و سحدود ۱۴ روز تا حدود ۳ روز است. دوره نهفتگی دوره ای است که ویروس در بدن فرد وجود دارد و هنوز علائم بیماری ظاهر نشده است. بايد توجه داشت که اینوپر و سعلاوه بر دوره ای بروز علائم حتی در دوره نهفتگی می تواند با درجات کمتریاز فرد آلوده بیدون علامت به فرد سالم منتقل شده او را اورانیز آلوده مبتلا سازد. به همین دلیل لازم است که افراد خانواده در زمانی که به دلیلی مجبور به حضور در محیطی بجز محیط امن خانه می شوند احتیاط های لازم را رعایت کنند.

راههای انتقال:

راه های انتقال مختلفی برای این ویروس مطرح شده است. ویروس در ابتدا از یک منبع حیوانی در چنین منتقل شده ولی هم اکنون انتقال آن انسان-به-انسان صورت می گیرد.

به طور معمول انتقال ویروس از طرق زیر منتقل می شود:

- تماس نزدیک با افراد مبتلا (در فاصله ایکمتر از ۲-۱ متر)

تماس با قطرا تو رشح اتنستگاه تنفس فرد آلوده را از عطسه یا سرفه

- تماس دست ها با سطوح آلوده به ویروس سپس لمس دهان، چشم ها و بینی

به طور معمول انتقال ویروس های عامل بیماری های تنفسی از فرد آلوده به فرد سالم بیشتر در زمانی صورت می گیرد که فرد مبتلا دارای علایم است. اما همانطور که ذکر شد، ویروس کورونا یجدید در فرد آلوده بدون علامت نیز می تواند به فرد سالم منتقل شود. این خصوصیت شرایط مساعد تری را برای انتشار ویروس سوا یجاد همه گیرید را جامعه فراهم می نماید.

اقدامات لازم به منظور پیشگیری از آلودگی:

بار عایت نکات ذیل میتوان بهمیز اనقابل توجه ای احتمال بمتلا و انتشار ویروس را کاهش داد:

مرتبه استفاده از خود را با استفاده از آب و صابون بیندیت ۲۰ ثانیه بشویید و یا با مواد ضد عفونی کننده الکلی ضد عفونی نمایید. •

اگر دستهای شما به وضوح آلوده است ابتدا باید با آب جاری و صابون بشویید. •

شستشوی دست به صورت مکرر توصیه می شود به خصوص در موارد زیر: •

- بعد از سرفه، عطسه

- بعد از تمیز کردن بینی

- قبل و بعد از مراقبت از بیمار

- قبل از غذا خوردن

- بعد از استفاده از سرویس بهداشتی

- بعد از لمس حیوانات و محصولات حیوانی، تماس با مدفوع حیوانات و سایر پسماندهای آنها

از دیگران در مقابل بیماری محافظت کنید. •

هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با دستمال یا آرنج خمیده خود بپوشانید. •

این عمل مانع تابقطرات آلوده بر روی صورت سایر افراد یا سطوح حاوآلودگی آنها می شود و چرخه انتقال بیماری را قطع می کند. •

دستمال را پس از استفاده فوراً درون یک سطل زباله در بسته بیندازید. •

زمانی که دارای نشانه های سرفه و تب هستید از ارتباط نزدیک با سایرین خودداری کنید. •

از تماس نزدیک با هر کسی که بوسیله فهدار خوددار یکنید. •

سطوح حاوای بیرونی معرض تماش مکرر با دست ها هستند (مانند گوشی تلفن همراه، دستگیرهای آسانسور و ...). •

را بالاستفاده از اسپریها یا پارچه های آغشته بهم و مواد ضد عفونی کننده (برای ایستادن یا مسکونی) می تواند کمک کند. •

تصویر تمکر تمیز و ضد عفونی کنید. •

حداقل روزی یک بار وسایل و تجهیزات و محیط کار را ضد عفونی کنید. •

از انداختن آب دهان در مکان های عمومی پرهیز کنید. •

- از تماس دستهای شسته هباقشمهای بینی و دهان خوددار یکنید.
- بیماران یا مراقبین آنها و همچنین افرادی که دارای علایم تنفسی (سرمهی عطسه) هستند باید ماسک بزنند.
- پوشیدن ماسک در اماکن عمومی توسط افراد سالم و بدون علایم سرماخوردگی توصیه نمی شود، مگراینکه این افراد در فاصله نزدیک (کمتر از یک و نیم متر) با بیمار دارای علایم سرماخوردگی (در محیط بسته) باشند و آداب بهداشتی عطسه و سرفه توسط فرد دارای علایم رعایت نشود.
- استفاده از ماسک، در این موارد توصیه می شود:
- زماری که علایم تنفسی (سرمهی عطسه) داری
- از فرد مبتلا به این بیماری مراقبت می کری
- مبتلا به این بیماری هستی
- از تماس با حیوانات اهلی و وحشی اجتناب کنید و در صورتی که مجبور لمس حیوانات و محصولات حیوانی بودید، از روپوش، دستکش و ماسک محافظ استفاده کنید.
- پوششهای محافظ چند بار مصرف را بعد از کار درآورید، روزانه بشویید و در محیط کار بگذارید.
- هنگام بیماری از دست دادن و روبوسی با دیگران خودداری نمایید.
- از رها کردن دستمال کاغذی های استفاده شده در محیط خودداری کنید.
- هنگام بیماری از حضور اماکن عمومی خودداری کنید.
- اگرتب، سرف، تنگی نفس، گلو درد و یاهر گونه مشکل دیر تنفس دارد، سریع به پزشک مراجعه کنید و سابقه سفر قبلی خود را به پزشک اطلاع دهد.
- از بازدید از بازارهایی که در آن ها حیوان زنده عرضه می شود، خودداری کنید و در صورتی که به دلیلی مجبور به این کار هستید، از تماس مستقیم محافظت نشده با حیوانات نزد هوس طوح در تماس با حیوانات خودداری کنید.
- از مصرف مخصوصات حیوانی خامیا پخته نشده احتساب کنید.
- گوشت خام، شیر یا اندامهای حیوانی خام باید با حتی اطنگه داری شوند تا از تماس آنها با غذا پخته شده هوآلودگی غذای لوگیری شود.
- تا حد امکان سفرهای غلو ضروری و حضور در اماکن شلوغ را محدود نمایی.

روش تشخیص بیماری:

معمول‌آز طریق کیت‌های آزمایشگاهی توستاخ تصاصیم رتبه تشخیص داده می شود که در بیمارستان و مراکز درمانی خاص انجام می شود. نکته مهم این است که بیماریان با علائم خفیف نیازی به طی مراحل تشخیص آزمایشگاهی ندارند و در صورت تشخیص پزشک و با رعایت دستورات درمانی وی می توانند دوره بیماری و نقاوت خود را در منزل و با رعایت استانداردهای لازم برای قرنطینه کردن خود بگذرانند.

درمان:

در حال حاضر هیچ نوع داروی ضد ویروس اختصاصی و واکسن برای کوروناویروس جدی ۲۰۱۹ وجود ندارد. با توجه به آنکه در حال حاضر از هر ۱۰ بیمار مبتلا ۸ نفر دچار علائم خفیف در حد سرماخوردگی می‌شوند (عمدتاً تبعه سرفه عمدتاً خشک بعنوان علام اصلی باضافه علائم فرعی نظیر آبریزش، سردرد، گلو درد، احساس خستگی کوفتگی) افرادی که مبتلا به این بیماری شده اند باید از درمان های حمایتی و علامتی استفاده کنند (استراحت در منزل، مصرف مانعات فراوان نظیر سوپ و آب مرکبات، و مسكن های تب بر). در موارد شدید بیماری که رکز به بستری در بیمارستان دارند (علاوه بر تب و سرفه علائم دشواری تنفس و تنگی نفس نزی به علائم اضافه می‌شود) درمانها توسط کادر درمانی در بیمارستان انجام می‌شود.

افرادی که فکر می‌کنند با بیماران مبتلا به کوروناویروس تماس نزدیک داشته اند لازم است در اولین فرصت با سامانه ۴۰۳۰ ارتباط برقرار کنند و یا از طریق درگاه www.salamat.gov.ir اقدام کنند و بر اساس توصیه های انجام شده، اقدام کنند.

نکته مهم: افراد بیمار تا زمان انتقال به مراکز درمانی، حتی امکان در یک مکان جدا از سایرین نگهداشته شوند ..

برای مراقبت از سایر افراد خانواده به موارد زیر به دقت توجه کنید

نوزادان:

اگر در خانه نوزاد دارید در شرایط کنونی چه نکاتی را باید در مراقبت از او رعایت کنید:

- در صورتی که در خانواده همه افراد سالم بوده و مبتلا به COVID ۱۹ نمی باشند، لازم است مطابق دستور عمل های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، مادر یا فرد مراقب نوزاد در منزل اصول بهداشت فردی و پیشگیرانه را قبل و بعد از هر گونه مراقبت و تماس با نوزاد (تجذیه نوزاد، تعویض پوشک، تماس با مایعات و ترشحات بدن نوزاد و ...) رعایت کند و دستان خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت ۲۰ ثانیه و در صورت نبودن صابون مایع با مواد ضد عفونی کنده با پایه حداقل ۶۰ درصد الکل، بشوید.
- تماس پوستی با نوزاد را به حداقل ممکن کاهش دهید و از بوسیدن نوزاد جداً خودداری کنید.
- از تجمع بر بالین نوزاد پرهیز کنید.
- از شرکت کردن یا به همراه بردن نوزاد در مهمانی ها و مراکز تجمع جمعیت به جز در موارد ضروری (واکسیناسیون و) خودداری کنید.
- از مصرف مواد دخانی (سیگار، قلیان و ...) در منزل خودداری کنید.
- در صورتی که برای تجذیه شیرخوار نیاز به شیر دوشیده شده مادر است، جمع آوری و ذخیره شیر باید با رعایت اصول بهداشتی انجام شود. در صورت استفاده از شیردوش دستی یا برقی، مادر باید دست های خود را قبل از لمس هر قسمت پمپ یا ظرف ذخیره سازی شیر بشوید. بعد از هر نوبت شیردوشی تمام اجزای شیردوش که با پستان و دست مادر در تماس بوده باید شسته و ضد عفونی شود.
- در صورتی که نوزاد از شیر مصنوعی استفاده می کند، اصول بهداشتی را در زمان شستشوی ظرف شیر و تهیه شیر مصنوعی رعایت کنید.

در صورتی که در خانواده، فرد محتمل یا مشکوک ابتلا به COVID ۱۹ وجود دارد علاوه بر توصیه های بالا، رعایت موارد

زیر الزامی است:

- ۱ - در صورت امکان در منزل، یک اتاق جداگانه برای نوزاد اختصاص دهید و در صورت در دسترس نبودن اتاق جداگانه، نوزاد باید حداقل ۲ متر از فرد محتمل یا مشکوک به ابتلا به COVID ۱۹ فاصله داشته باشد.
- ۲ - در صورتی که مادر نوزاد مشکوک ابتلا به COVID ۱۹ باشد، در صورت بستری نشدن مادر یا مرخص شدن وی از بیمارستان به علت بیماری کرونا، مادر و نوزاد می توانند با رعایت الزامات قرنطینه خانگی در کنار هم باشند به شرطی که:
 - ✓ قبل و بعد از هر گونه مراقبت و تماس با نوزاد (تجذیه نوزاد، تعویض پوشک، تماس با مایعات و ترشحات بدن نوزاد و)، مادر دستان خود را با آب و صابون مایع حداقل به مدت ۲۰ ثانیه بشوید و از ماسک و دستکش یک بار مصرف استفاده نماید و بعد از انجام مراقبت ها، ماسک و دستکش با رعایت اصول بهداشتی دور انداخته شوند.
 - ✓ تجذیه شیرخوار از پستان مادر به شرط رعایت اصول بهداشتی (شستشوی دستور نهاده) منعیدارد.
 - ✓ در صورت بروز علایم ناخوشی در نوزاد (پایین آمدن یا افزایش مشخص دمای بدن نوزاد، مشکلات تنفسی و تنفس تند و خوب شیر نخوردن) نوزاد بلا فاصله به بیمارستان (حتی الامکان دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان) برده شود.
 - ✓ در صورتی که نوزاد از شیر مصنوعی استفاده می کند، رعایت اصول بهداشتی در زمان شستشوی ظرف شیر و تهیه شیر مصنوعی مورد تأکید قرار گیرد. زدن ماسک در زمان تهیه و دادن شیر به نوزاد الزامی است.

- ۳ - اگر حال عمومی مادر با تشخیص قطعی، خوب است و در بیمارستان بستری نشده است، نوزاد باید به مدت ۲ هفته فرنطینه خانگی شود و تغذیه نوزاد با شیر دوشیده مادر که با رعایت اصول بهداشتی جمع آوری شده است و توسط فرد سالم خانواده انجام گیرد.

کودکان:

اگر در خانه کودک زیر ۵ سال دارید، دقت در موارد زیر و رعایت نکات درج شده کمک کننده خواهد بود:
از آن جا که این ویروس جدید است و هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه تأثیری بر کودکان خواهد گذاشت ، لازم است که همانند بزرگسالان از کودکان هم در مقابل ابتلا به این بیماری مراقبت شود یا در صورت بروز علائم، دقت شود که به موقع درمان شود. اغلب موارد تایید شده‌ای ابتلا به COVID-19 در بزرگسالان رخ داده است. عفونت گزارش شده کودکان هم در کودکان خردسال بوده است.
ویروس فقط در موارد نادر کشنده است و تاکنون بیشتر موارد منجر به مرگ در میان افراد مسن تر با بیماری‌هاییزمنیه‌ای دیده شده است .

ولی بخاطر داشته باشید کودکان می‌توانند ناقل بیماری باشند

اقدامات لازم در کودک دارای علائم احتمالی COVID-19

رعایت نکات بهداشتی دست‌ها (شستشوی مرتب آن‌ها) و بهداشت تنفسی را ادامه دهید و واکسیناسیون کودکان خود را به موقع انجام دهید تا کودک‌لندر مقابل سایر ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا در امان باشد .
تفاوت علائم بالینی کودکان با علائم بالینی بزرگسالان

در گزارش‌های محدود از ابتلا کودکان به COVID-19 در چین، علائم شبه سرماخوردگی مانند تب، آبریزش بینی و سرفه را گزارش کرده اند. علائم گوارشی مانند اسهال و استفراغ حداقل در یک کودک مبتلا به COVID-19 گزارش شده است. این گزارش‌های محدود نشان می‌دهد که کودکان مبتلای تأیید شده اغلب علائم خفیفی نشان داده اند و عوارض شدید (سندرم ARDS و شوک سپتیک) از موارد نادر هستند.

اقدامات لازم در زمان ابتلای سایر اعضای خانواده به بیماری

اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس دارید از همان ابتدای بروز علائم از پزشک کمک بخواهید. اگر به مناطقی که COVID-19 در آنجا گزارش شده سفر کرده‌اید یا اگر در تماس با فردی بوده‌اید که به تازگی به یکی از چنین مناطقی سفر کرده و علائم تنفسی دارد با پزشک خود یا با کارکلن بهداشتی تماس بگیرید و با آنها مشورت کنید .
شرایط عدم حضور کودک در مدرسه و مانندنوی در خانه

- اگر کودک‌علائم‌بیماری دارد، از پزشک کمک بخواهید و به دستوراتی که پزشک یا کارکلن بهداشتی می‌دهد، عمل کنید.
در صورتی که نیاز به بستری نداشت، در خانه به خوبی از وی مراقبت کنید و به اماکن عمومی نروید تا بیماری به دیگران سرایت نکند .

- حتماً به اطلاع‌یهای بخششنامه‌ای صادره از مراجع معترض و ذیصلاح توجه کرده و آنها را پیگیری نمایید.
- به کودک‌آموزش‌دهیدستهای را خوب بشوید و نکات بهداشتی را همیشه رعایت کند از جمله:
دهان خود را به هنگام عطسه یا سرفه با دستمال یا آرنج خم شده بپوشاند و سپس دستمال مصرف شده را داخل سطل دربسته بیندازد، چشم‌ها، دهان یا بینی را در صورتی که دست‌ها کاملاً شسته نشده‌اند، لمس نکند

کاهش استرس کودکان در مواجهه با بیماری کرونا

- کودکان ممکن است به روش‌های مختلفی نسبت به استرس واکنش نشان بدهند، مثلاً به والدین بیشتر بچسبند، مضطرب، گوش‌گیر یا عصبانی و آشفته شوند و حتی دچار شب ادراری شوند.
- به نگرانی‌هایش گوش دهید و تا می‌توانید محبت و توجه بیشتری نثارش کنید.

- کودکان در شرایط سخت به محبت و توجه بزرگترها نیاز دارند. بنابراین تا می‌توانید به آنها توجه کنید و برایشان وقت بگذارید.
- به حرفهای کودک گوش کنید، با مهربانی با او صحبت کنید و به او اطمینان خاطر دهید.
- تا حد ممکن فرصت بازی کردن با کودک و شرایط آرامش او را فراهم کنید.
- کودکان باید نزدیک والدین و خانواده خود باشند و تا حد امکان از جدا کردن آنها از سرپرستانشان خودداری کنید.
- چنانچه به دلایل مختلف از جمله بستری شدن در بیمارستان مجبور به جدایی از کودک شدید، مرتب با او تماس (مثلًاً تلفنی) داشته باشید و به او اطمینان دهید که همه چیز مرتب است.
- تا حد ممکن برنامه‌های روزمره و منظم کودک را ادامه دهید یا در محیط‌های جدید برنامه‌های جدید اجرا کنید، مثلًاً اگر در مدرسه هستند با فعالیت آموزشی جدید و بازی، شرایط آرامی برایش فراهم کنید.
- واقعیت‌ها را درمورد اتفاقات اخیر بگویید، با کلمات ساده که برای سن کودک قابل درک باشد برایش توضیح دهید چه اتفاقی افتاده و راههای کاهش خطر ابتلا به بیماری را بطور واضح به او بگویید.
- اطلاعاتی هم راجع به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد به کودک بدهید. مثلًاً این که ممکن است یکی از اعضای خانواده یا خود کودک احساس کنند حالشان خوب نیست و مجبور شوند برای مدتی به بیمارستان بروند تا پزشکان کمک کنند حالشان بهتر شود.
- اگر کودک شیر خوار است به نکاتی که در مورد شیر دادن در قسمت نوزادان اشاره شده توجه شود.
- حتی الامکان از حضور سایر کودکان در کنار کودک خود ممانعت بعمل آورید.

نوجوانان:

- به علت تعطیل بودن مدارس، نوجوانان در منزل هستند. از تجمع چندین نوجوان در کنار هم خودداری شود.
- با توجه به تعطیلی مدارس، شرایطی در منزل فراهم گردد تا نوجوان به روش‌های مختلف نظری تماسای فیلم‌های مورد علاقه، خواندن کتاب، بازی‌های مختلف سرگرم و اوقات فراغت او پر باشد.
- وسایل بازی، لوازم التحریر، کتاب‌های درسی و غیر درسی مورد استفاده در صورت امکان قبل از استفاده ضد عفونی شوند و پس از استفاده، دست‌ها با آب و صابون شسته شوند. به نوجوان آموزش دهید از به دهان بردن لوازم التحریر و سایر اشیاء مشابه خودداری کند.
- تبلت، لپ‌تاپ، تلفن همراه، وسایل بازی، کنترل تلویزیون و ... ضد عفونی و تمیز شوند.
- مطمئن شوید که نوجوان نحوه صحیح شستشوی دست‌ها را می‌داند و مطابق با آن عمل می‌نماید. هم چنین از سرویس بهداشتی با رعایت مسائل ایمنی و بهداشت استفاده می‌نماید.
- به نوجوان آموزش دهید از دست زدن به اشیاء غیر ضروری تا عادی شدن شرایط خودداری کند.
- حتی الامکان از همراه بردن نوجوان به بیرون منزل خودداری شود و در صورت ضرورت، از حضور در مکان‌های پر جمعیت خودداری شود.
- نوجوان را تشویق کنید تا در محیط خانه به نرم‌ش و ورزش‌های ساده خانگی بپردازد.
- مراقب باشید تا نوجوان از غذاهای سالم استفاده نماید. میوه‌ها و سبزی‌ها را در رژیم غذایی خود داشته باشد؛ مایعات کافی بنوشد و از مصرف غذاهای پرکالری، فست فودها و نوشابه‌های گازدار خودداری کند.
- اگر در خانواده فرد مشکوک یا مبتلا به کووید ۱۹ وجود دارد، تمام نکات مذکور در مواجهه با افراد مشکوک و بیمار را رعایت کنید.

سالمندان:

- اهمیت بیماری کرونا در سالمندان و ضرورت توجه به آن و توصیه‌های لازم به منظور پیشگیری:
- سالمندان و افراد دچار بیماری مزمن را از محیطی که بیمار کرونا وجود دارد، دور کنید.

- سالمندان به دلیل کاهش توان مقابله‌ی کارآمد بدن با بیماری‌ها و ابتلا به بیماری‌های همزمان، در برابر این ویروس آسیب پذیرتر هستند و ممکن است وحشت بیماری و عوارض آن در آنها شدیدتر باشد.
- الگوی تظاهر علائم و نشانه‌ها در سالمندان ممکن است متفاوت از سایر گروه‌های سنی و غیر اختصاصی باشد
- در صورت ابتلای سالمند به بیماری زمینه‌ای، مطمئن شوید که داروهای خود را به موقع و به مقدار تجویز شده مصرف می‌نمایید.
- با توجه به اینکه بهترین راه پیشگیری، قطع حلقه‌ی انتقال آن از بیرون منزل به داخل آن است که عموماً توسط اعضاء فعال خانواده صورت می‌گیرد، رعایت بهداشت و بخصوص شستشوی مرتب دست‌ها توسط سایر اعضای خانواده هنگام ورود به منزل در پیشگیری از ابتلای سالمند به کمود ۱۹ حائز اهمیت است.
- رعایت فاصله ایمن با سالمند، عدم تجمع در اطراف وی، پرهیز از روبوسی و هر گونه تماس فیزیکی در پیشگیری از ابتلای سالمند نقش بسزایی دارد.
- اهمیت شستشوی مداوم دست‌ها و چگونگی انجام صحیح آن را به سالمند آموزش دهید و مطمئن شود به خوبی آن را انجام میدهد.
- سطوح و وسایل در تماس با سالمند نظیر سرویس بهداشتی، دستگیره‌ها و ... را ضد عفونی کنید.
- لوازم اختصاصی مورد استفاده سالمند مانند دندان مصنوعی، عصا، واکر و ... را مرتب ضد عفونی نمایید.
- در محل سکونت سالمند، ترتیبی اتخاذ شود تا جریان‌ها برقرار باشد و تهویه مناسب صورت گیرد.
- در صورت لزوم از ماسک، دستکش و دستمال برای سالمندان و اطرافیان استفاده شود.
- از نظر روحی و روانی سالمند را تقویت نمایید. از استرس وی را دور نگه دارید و به او آرامش دهید.
- در صورت بروز علائمی نظیر سرفه، تنگی نفسی، خستگی، احساس سنگینی در قفسه سینه، گیجی، کاهش هشیاری، هذیان گویی، فوراً سالمند را برای معاینه نزد پزشک ببرید یا در موقع اورژانس از ۱۱۵ کمک بگیرید.
- مصرف آب فراوان، مصرف آب کلم، آب گوجه فرنگی، توت فرنگی، کیوی، کدو تنبیل، پرتقال (بویژه تو سرخ)، گریپ فروت، لیمو، انار، هویج، مصرف سبزیجات تازه همراه با بیلیمو ترشیا آبنارنج توصیه می‌شود. مطمئن شوید از حبوبات و تخم مرغ (حداکثر سه عدد تخم مرغ در هفته) استفاده می‌کند. از مصرف سوسيسيسو كالباسوساير فستفوودها و غذاها چرخه سونگين خودداری شود.

مراقبت از سالمندان مبتلا به کرونا در منزل :

- رعایت بهداشت دست، کنترل محیطی (نظافت و ضد عفونی)، دفع بهداشتی زباله (ماسک، دستمال و استفاده از سطل زباله‌ی در دار و پدال دار) در محل سکونت، بسته بندی و حمل وسایل مربوط به مراقبت از بیمار و جلوگیری از صدمات اجسام نوک تیز مرتبط با سالمند حائز اهمیت است.

اقدامات احتیاطی بیشتر:

- شناخت زود هنگام بیماری از طریق علائم و کنترل منبع عفونت در محل سکونت
- تشویق سالمندان علامت دار به ماندن در اتاق‌های مجزا و دارای تهویه مناسب
- سرو و عده غذایی سالمند در اتاق محل اقامت
- توصیه به مراقبت از سالمند توسط تنها یک نفر یا افراد محدود مرتبط با سالمند
- سالمند و سایر اعضای خانواده باید هنگام سرفه کردن یا عطسه کردن با استفاده از دستمال یک بار مصرف، ماسک‌ها یا آرنج خمیده، بینی و دهان خود را بپوشانند تا ترشحات تنفسی در محیط خانه پخش نشود و به دنبال آن نکات بهداشتی دست انجام شود.
- فرد نگهداری کننده سالمند باید اصول اقدامات پیشگیری کننده به ویژه اصول پیشگیری از انتقال از راه تنفس و تماس را بداند و برای اعضای خانواده و سالمند علامت دار ترویج کند و از وجود امکانات کافی برای شستشوی دست و دستمال‌های ضد عفونی کننده در صورت عدم دسترسی به محل شستشو برای اعضای خانواده و بویژه سالمند علامت دار اطمینان حاصل کند.

- باید منابع کافی برای دفع بهداشتی ترشحات و خلط‌ها مانند سطل بدون لمس یا پدال دار دردسترس سالمند فراهم شود.
- فاصله مناسب (۱ تا ۲ متر) هنگام مراقبت از سالمند علامت دار رعایت شود.
- در بیان هشدارهای لازم به سالمندان به نحوی رفتار کنید که موجب ترس و اضطراب آنان نشود.

زنان باردار:

زنان باردار نسبت به جمعیت عمومی در برابر این عفونت آسیب پذیرتر (مرگ و عوارض شدید) هستند

- زنان باردار به واسطه تجربه تغییرات ایمونولوژیک و فیزیولوژیک ممکن است در برابر این عفونت آسیب پذیرتر باشند. زنان باردار ممکن است در معرض بیماری شدید، عوارض شدید و مرگ بیشتری نسبت به جمعیت عمومی باشند. به همین دلیل زنان باردار بایستی اقدامات پیشگیری کننده را جهت ممانعت از بیماری (مانند دست شستن و عدم تماس با افراد بیمار) رعایت کنند.

پرسنل باردار شاغل در مراکز بهداشتی - درمانی در تماس با بیماران مبتلا در معرض خطر بیشتری هستند

- این زنان باردار طبیعتی از دستورالعمل‌های ارزیابی خطر و کنترل عفونت پیروی کنند. پیروی دقیق از توصیه‌های پیشگیری و کنترل عفونت یک مکانیسم مهم حفاظت است. مراکز بهداشتی درمانی ممکن است در صورت دسترسی به پرسنل کافی، از سیاستهای کاهش تماس پرسنل باردار با موارد مشکوک / مبتلای قطعی در موارد ارائه خدماتی که با افزایش تولید آئروسل می‌باشد، استفاده کنند.

امکان انتقال عفونت از مادر به جنین

- انتقال ویروس معمولاً از طریق انتقال ترشحات تنفسی رخ می‌دهد. با توجه به تعداد شواهد موجود فعلی هنوز احتمال انتقال عفونت داخل رحمی از مادر بیمار به جنین تأیید نشده است. در بررسی ترشحات شیر و مایع آمنیوتیک در مادران مبتلای قطعی، ویروس رویت نشده است.

اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از زنان و نوزادان در برابر COVID-19

- اقدامات پیشگیرانه شامل این است که مرتبًاً دستان خود را تمیز کنند، هنگام سرفه جلوی دهان خود را با خم آرنج یا دستمال بپوشانند و حداقل فاصله ۱-۲ متر را با افرادی که سرفه یا عطسه میکنند، حفظ نمایند.

خطرات زایمانی در جنین مادران مبتلای قطعی

- در موارد کووید ۱۹ مثبت در موارد کمی که رویت شده احتمال زایمان زودرس مطرح شده است. البته مشخص نیست که این مشکل بدلیل عفونت مادر بوده است و تاکنون احتمال عوارض جدی زایمانی مشخص نشده است.
- در موارد ابتلای آنفلوآنزا، MERS و SARS، وزن کم زمان تولد و زایمان زودرس گزارش شده است، البته تب در سه ماهه اول بارداری می‌تواند منجر به نواقص جسمی جنین شود

با ورود به سامانه www.salamat.gov.ir از غربالگری خود و خانواده تان در برابر ابتلا به کرونا ویروس اطمینان حاصل نمایید.

مهم ترین اقدام شما در خانواده این است که توصیه‌های بهداشت فردی و نحوه شستشوی صحیح دست و استفاده صحیح از مواد ضد عفونی کننده را رعایت کنید.