




مرکز درمانی / آموزشی آیت الله طالقانی



در مورد عمل

کیست تخمدان چه می‌دانید؟

سوپروراایزو آموزشی

توصیه می‌شود از برداشتن اجسام سنگین و
ایستادن طولانی اجتناب کنید.



یک هفته پس از ترخیص به درمانگاه مراجعه
کنید، با صلاحیت پزشک بخیه‌های شما در
این تاریخ کشیده خواهد شد.

نکات قابل توجه

توصیه می‌شود تا بهبودی کامل مراقبت‌های
درمانی را پیگیری کنید و در تاریخ‌های مقرر به
پزشک خود مراجعه نمایید.

خانم‌هایی که در سینین بارداری قرار دارند
لازم است مطلع باشند که تنها حفظ یک
تخمدان باعث باروری می‌شود، اما در
صورتیکه جراح مجبور به برداشتن هر دو
تخمدان شود شما دچار یائسگی شده و
توانایی باروری را نخواهید داشت.

اگر تخمدان‌های شما برداشته شده می‌توانید
از جایگزین کننده‌های هورمونی با صلاحیت
پزشک خود استفاده کنید.

حتماً با جواب پاتولوژی جهت پیگیری درمان
به پزشک معالج خود مراجعه نمایید.

منبع: تلیند ۲۰۱۵

تئیه کننده: سوپروراایزو آموزشی

ویرایش ۱۳۹۶

درد بعد از عمل طبیعی است و پرستار شما با
استفاده از مسکن‌های تجویز شده توسط
پزشک در تسکین درد به شما کمک می‌کند.

خروج از تخت

معمولًا روز بعد از عمل سوند ادراری خارج
شده و به شما اجازه داده خواهد شد تخت
خود را ترک کنید. در اینصورت لازم است ابتدا
۱۵ دقیقه لبه تخت نشسته و پاهای خود را
آویزان کنید، در صورتی که سرگیجه نداشتید
با کمک پرستار از تخت خارج شده و راه
بروید.

مراقبت از محل عمل

معمولًا ۴۸ ساعت بعد از عمل پانسمان
ناحیه‌ی عمل برداشته می‌شود و می‌توانید
دوش سرپایی بگیرید؛ در غیر اینصورت در
زمان مورد نظر با صلاحیت پزشک می‌توانید
پانسمان را برداشته و دوش سرپایی بگیرید،
سپس ناحیه‌ی عمل را با دستمال تمیز خشک
کرده و نیازی به پانسمان مجدد نیست.

مراقبت در منزل

پس از ترخیص تا یک هفته از غذاهای نفاذ
(مثل حبوبات و پیاز) استفاده نکنید. از مواد
غذایی ملین و فیبردار مانند سبزیجات، میوه و
روغن زیتون استفاده کنید تا از یبوست
جلوگیری شود.

آموزش‌های قبل از عمل

شب قبل از عمل شام سیک (سوپ) میل کنید و از ساعت ۱۲ شب ناشتا باشید. لازم است قبل از عمل استحمام کنید و موهای ناحیه‌ی جراحی را کاملاً کوتاه کنید، اینکار باعث کاهش احتمال عفونت می‌گردد. قبل از عمل طلا و جواهرات، اجسام فلزی، گیره‌ی سر، لنز و دندان و اعضاء مصنوعی خود را خارج کنید و لباس مخصوص اتاق عمل پوشید.

احتمال دارد صبح روز عمل برای شما سوند ادراری گذاشته شود.

در صورتی که تحت درمان بیماری‌های خاص مثل دیابت هستید به پزشک یا پرستار خود اطلاع دهید؛ زیرا در برخی موارد لازم است داروهای شما موقتاً قطع یا با سایر داروها جایگزین گردد.

بی حرکتی پس از عمل می‌تواند سبب رکود خون در پاها و افزایش احتمال عفونت ریه‌ها گردد، لذا ورزش‌های تنفسی و چرخش پاها را که به شما آموزش داده شده، بالاصله بعد از عمل جراحی انجام دهید.

عمل جراحی شما ممکن است تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی نخایی انجام شود.

آموزش‌های بعد از عمل

روز اول نبایستی چیزی بخورید. از زمانی که پرستار به شما اجازه داد، ابتدا رژیم مایعات را شروع کرده و به تدریج با نظر پزشکان می‌توانید از سایر مواد غذایی استفاده نمایید.

تشخیص

بیماری از طریق تستهای زیر تشخیص داده می‌شود:

- علائم بالینی
- معاینه لگنی
- سونوگرافی
- ممکن است از لاپاراسکوپی جهت تایید، تعیین اندازه و محل و حتی برداشتن کیست استفاده شود.
-

درمان

کیستهای کوچک ساده

از تجویز داروهای ضد بارداری برای سرکوب فعالیت تخدمان و تحلیل (کوچک شدن) کیست استفاده می‌شود و بیمار تحت نظر گرفته می‌شود.

سندرم تخدمان پلی کیستیک

تجویز داروهای ضد بارداری خوراکی کیستهای بزرگ، مرکب، مشکوک و دارای اجزاء جامد: جراحی

دارو درمانی

در صورت تجویز داروهای ضد بارداری خوراکی، این داروها عوارضی مثل احتیاط آب (تجمع آب در بدن) یا تهوع دارد. در صورتیکه این علائم در شما شدید باشد یا سابقه‌ی بیماری قلبی یا فشار خون دارید به پزشک خود اطلاع دهید.

توده‌ی حاوی مایع که درون یا روی یک یا هر دو تخدمان رشد می‌نماید را کیست تخدمان گویند. تخدمانها محل شایعی برای کیست هستند.

انواع کیست تخدمان

انواع بسیاری از کیست تخدمان وجود دارد. شایعترین نوع آنها کیست فولیکولی می‌باشد که کیست در یکی از فولیکول‌ها که تخدمک در آن رشد می‌کند، نمو کرده و پر از مایع می‌شود. تصور می‌شود کیستهای متعدد کوچک که در تخدمان رشد می‌نماید به علت اختلالات هورمونی ایجاد می‌شوند و به این حالت سندرم تخدمان پلی کیستیک گویند.

علائم بیماری

- احساس ناراحتی در شکم
- درد به هنگام مقاریت
- بی نظمی قاعدگی گاهی همراه با خونریزی شدید می‌باشد.
- خونریزی بعد از یائسگی
- کیستهای بزرگ می‌توانند موجب فشار روی مثانه و احتیاط ادرار شوند و تکرر ادرار را ایجاد کنند.
- اگر کیستی پاره شده یا دچار پیچ خورده‌گی شود. موجب درد شدید شکم، تهوع و تب خواهد شد.