

پیام های کلیدی خبرنامه اخبار مراقبت (شماره 1)

1. سویه دلتا کرونا ویروس قابل انتقال ترین و سریع ترین گونه از انواع شناسایی شده ویروس کرونا از ظهور تا کنون است و به سرعت در بین جمعیت واکسینه نشده در حال گسترش است .
2. تزریق واکسن کرونا به تنهایی جلوی پاندمی بیماری کووید را نخواهد گرفت .
3. ویروس دلتا تنها 4 روز پس از مواجهه و جای گیری در مخاط تنفسی قابل تشخیص و شمارش می باشد .
4. در یک بازه زمانی 6 روزه بار ویروس دلتا حدود 1260 برابر افراد آلوده به ویروس ووهان (اولین سویه کرونا) بوده است .
5. چنانچه در افرادی که هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند نشانه مشکوک به ابتلا بروز کند ،بایستی تست تشخیص آنتی ژن کرونا ویروس را انجام دهند و جدا سازی به اجرا گذاشته شود زیرا می توانند به اندازه افراد غیر واکسینه بیماری را به دیگران منتقل کنند .
6. در بیماران مبتلا به سویه دلتا میزان بستری 60٪ ، بیشتر از بیماران مبتلا به سویه آلفا می باشد .
7. یک بیمار مبتلا به سویه آلفا قادر به انتقال بیماری به 2 تا 3 نفر دیگر است ولی در سویه دلتا این عدد تا 8 نفر افزایش می یابد .
8. یک دوز واکسن حدود 31٪ در پیشگیری از سویه دلتا و 75٪ جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان تاثیر دارد بنابراین حتما نوبت دوم واکسن خود را بزنید .
9. تنها راه مقابله با کرونا انجام واکسیناسیون و عمل به پروتکل های بهداشتی بویژه ماسک زدن ، شستن صحیح دست ها و رعایت فاصله مناسب 2-1 متر از دیگران می باشد
10. کودکان و بزرگسالان زیر 50 سال به دلیل پوشش کمتر واکسیناسیون ،حدود 2 برابر بیشتر به سویه دلتا مبتلا می شوند.