



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
بهداشتی درمانی اراک

بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

روش اجرایی « استفاده صحیح از
مهار شیمیایی»

کد سند:
ISH/MDW/GEN/44
ویرایش: 0
تاریخ تصویب:
95/9/30
تاریخ:
بازنگری: 98/8/10
صفحه: /

هدف:

جلوگیری از ضربه بیمار به خود و دیگران
دامنه کاربرد:

تمام بخش های بالینی

تعاریف:

مهار شیمیایی یعنی استفاده از داروها جهت کنترل بیمار در پیشگیری از آسیب به خود و دیگران

مسئولیت ها و اختیارات:

پزشک معالج: دستور درمان

پرستار مسئول: پیگیری و مراقبت های پرستاری

کارکنان اجرای برنامه

شیوه انجام کار: (چه فعالیتی، چه زمانی در چه محلی و توسط چه کسی انجام شود)

شرایط استفاده از مهار شیمیایی در این بیمارستان به شرح ذیل می باشد:

- 1- پرستار / پزشک با ارزیابی بیمار، بیماران نیازمند به مهار شیمیایی را مشخص می نمایند. بیماران که (رفتارهای تهاجمی؛ رفتارهای خطرناک برای بیماران دیگر، رفتار خودتخریبی، رفتار فیزیکی یا کلامی تهدیدکننده یا سابقه پرخاشگری و تهاجم، مسمومیت با الکل، داروهای همراه با کنترل ضعف یا فقدان کنترل رفتارها، رفتارهایی همراه با کنترل ضعیف و سابقه تهاجم و رفتارهای خود آسیب رسانی همراه با کنترل ضعیف، خواست خود بیمار) را دارا هستند.
- 2- سابقه دارویی و حساسیت های بیمار توسط پزشک شناسایی می شود و برای پیشگیری از تداخلات دارویی ارزیابی می شود.
- 3- پرستار مسئول بیمار در صورت بی-قرار بودن بیمار، ضمن معرفی کامل بیمار و شرح وضعیت بالینی، علت بی-قراری بیمار را به پزشک معالج بیمار گزارش می-نماید. همچنین در صورت لزوم صدمات حاد وارده به بیمار را نیز اعلام می-نماید
- 2- پزشک معالج موظف است در برگه دستورات پزشک نوع مهارشیمیایی و مدت زمان اجرایی شدن مهار شیمیایی را به شکل شروع و پایان مدت زمان مشخص نماید. (قطع آن در کوتاه ترین زمان ممکن)
- 3- پرستار مهار شیمیایی بیمار را باید طبق دستور زمانی و نوع مهار شیمیایی که پزشک دستور داده است به انجام رساند.
- 4- پرستار در صورت نیاز بیمار به مهارشیمیایی مجدد، به پزشک اطلاع دهد و پس از بررسی مجدد بیمار دستورات مهارشیمیایی مجدد توسط ایشان نوشته شود. (با توجه به محدودیت استفاده از مهار شیمیایی در هر روز حداکثر سه بار)
- 5- قبل شروع مهار شیمیایی تمهیدات ایمنی بیمار از قبیل احتمال سقوط مانیتورینگ مداوم، پوزیشن بیمار و... در نظر گرفته می شود
- 5- پرستار نحوه کنترل بیمار در دستورات مهار شیمیایی- مدت زمان (شروع- پایان) و واکنش های بیمار نسبت به آن را در برگه گزارش پرستاری ثبت می نماید.

تهیه کنندگان:



مترون - سرپرستار داخلی
- بهبود کیفیت

تأیید کننده:



مدیر بیمارستان

تصویب کننده:



رئیس بیمارستان



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی اراک

بیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان

روش اجرایی « استفاده صحیح از مهار شیمیایی»

کد سند:
ISH/MDW/GEN/44
ویرایش: 0
تاریخ تصویب:
95/9/30
تاریخ
بازنگری: 98/8/10
صفحه: /

- 6- پرستار از گرفتن دستورات شفاهی جهت اجرایی شدن مهار شیمیایی برای بیمارانی که اندیکاسیون آن در بالا ذکر شد حتی الامکان خودداری نماید.
- 7- پرستار موظف است در شرایط اورژانسی و بحرانی دستور شفاهی یا کتبی را در طی 1 ساعت اول دریافت نماید.
- 8- پرستار کنترل علایم حیاتی/ نیازهای تغذیه ای/ نیازهای اجابت/ حفظ حریم خصوصی/ نیازهای بهداشتی بیمارانی که تحت مهار شیمیایی قرار گرفته اند را ارزیابی کرده و موظف به برطرف کردن آنها با هماهنگی با پرسنل مربوطه (کارشناس تغذیه-خدمات) به انجام می رساند.
- منابع ، امکانات و کارکنان :**
نیروی انسانی، داروهای سداتیو.
- منابع / مراجع :**
کتاب استانداردهای خدمات پرستاری

تصویب کننده :

رئیس بیمارستان

تأیید کننده :

مدیر بیمارستان

تهیه کنندگان :

مترون - سرپرستار داخلی
- بهبود کیفیت