

تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۸/۱۱/۱

تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۸/۱۱/۲۳

تاریخ بازنگری بعدی: ۹۹/۱۱/۱

کد سند: IN/IP/04/01



بیمارستان ولی عصر (عج)
کمیته کنترل عفونت

موقعیت های استفاده از ماسک N95

عنوان دستورالعمل :

به طور کلی در مواجهه با بیماران مشکوک/محمتمل یا قطعی ذیل که نیاز به احتیاط هوایی (Air borne precaution) دارد و یا زمان انجام پروسیجرهای تولید کننده آئروسول (ساکشن ، اینتوباسیون ، تراکتوستومی ، برونکوسکوپی ، القای خلط، فیزیوتراپی ریه، عملیات احیاء ، جراحی های ریه) هر بیماری که نیاز به رعایت احتیاط قطرات (Droplet Precaution) دارد استفاده از ماسک N95 الزامی است.

سل ربوی یا حنجره	بیماریهای نیازمند احتیاط های مربوط به انتقال از طریق هوا (Air borne precaution) نحوه پوشیدن ماسک N 95 
سرخک	
آبله مرغان	
زونای منتشر	
بیماران دچار عفونت HIV همراه با سرفه و ارتشاح ریوی	
بیماران دارای زخم باز پوستی ناشی از سل	
کلیه بیماران با تب بالا، تنگی نفس با منشأ ناشناخته بخصوص در صورت سابقه سفر با مناطق پر آلوده یا تماس با افراد مشکوک یا آلوده به بیماریهای تنفسی واگیر	
سندرم حاد شدید تنفسی (SARI)	
تب های خونریزی دهنده ویروسی مانند تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)	
آنفلوآنزای H1N1، کرونا ویروس های سارس و مرس ، آنفلوآنزای نوع B	
مننژیت	
پنومونی مقاوم به چند دارو	
آنفلوآنزای ساده	
اوریون	
عفونت با مایکوپلازما پنومونیا	
سیاه سرفه	
سرخجه	
پاروویروس B19	
دیفتری حلقی	
مخملک	

❖ در شرایط اورژانسی یا عدم دسترسی به ماسک N95 می توان از ماسک جراحی معمولی به همراه ۲ عدد گاز استریل در ۴ لایه استفاده نمود. از پوشیدن ماسک جراحی زیر ماسک N95 خودداری نمائید و تست نشستی دم و بازدم ماسک را به شیوه صحیح مطابق شکل بالا انجام دهید. مدت زمان نگهداری ماسک N95 به شرط عدم آلودگی سطح داخلی ماسک ، خیس نشدن و نگهداری در کاور مناسب ۴ تا ۶ ساعت می باشد.