



فهرست آنتی دوت های ضروری مسمومیت ها در قفسه دارویی بخش اورژانس

وضعیت	توضیحات / کاربرد	تعداد	نام دارو	شکل و دوز دارو		نام فارسی دارو	ردیف
داروخانه مرکز	به عنوان جاذب گوارشی در اکثر مسمومیت ها	۳ سوسپانسیون یا ۱ بسته ۴۰ تایی	Activated Charcoal	Powder or suspension		زغال فعال	۱
-	مسمومیت با ارگانوفسفاتها، کاربامات ها، قارچ های موسکارینی، بلوک کننده های کانال کلسیم و بتا بلوکرها	۱۰	Atropine Sulfate	Amp	۱۰ mg/ml, ۲ ml	آتروپین	۲
داروخانه مرکز	مسمومیت با بلوک کننده های کانال کلسیم، بتا بلوکرها، املاح پتاسیم، املاح منیزیم، اتیلن گلیکول، اسید هیدرو فلوریک (HF) و گزش عنکبوت سیاه	۱۰	Calcium Gluconate ۱۰٪	Amp	۱۰ ml	کلسیم گلوکانات	۳
ولیعصر	مسمومیت با سیانید	۱	Cyanide Antidote Kit	-	-	آمیل نیتريت و نیتريت سدیم و تیوسولفات سدیم	۴
داروخانه مرکز	هایپوگلیسمی	از هر کدام ۵	Dextrose ۲۰٪, ۵۰٪	Vial	۵۰ ml	دکستروز ۲۰٪ و ۵۰٪	۵
داروخانه مرکز	مسمومیت با اپیوئیدها	۱۰	Naloxone HCl	Amp	۰.۴ mg/ml	نالوکسان	۶
-	مسمومیت با ایزونیازید، اتیلن گلیکول	۳	Pyridoxine Chloride	Amp	۵۰ mg/ml, ۲ ml	پیریدوکسین	۷
داروخانه مرکز	مسمومیت با ضد افسردگی سه حلقه ای، کینیدین، داروهای آنتی ریتمی کلاس IA و IC ، سالیسیلاتها و فنوباریتال	۵	Sodium Bicarbonate ۸.۴٪	Vial	۵۰ ml	سدیم بیکربنات	۸
داروخانه مرکز	مسمومیت با وارفارین و سوپروارفارین	۳	Vitamin K <sup>۱</sup>	Amp	۲mg, ۱۰ mg	ویتامین کا	۹

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۹/۸/۱۹	تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۸/۸/۱۹
تایید کننده: کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی	تهیه کننده: دکتر نگار نفیسی
	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۸/۱۹



فهرست آنتی دوت های ترجیحی مسمومیت ها در بخش اورژانس

ردیف	نام فارسی دارو	شکل و دوز دارو	نام دارو	توضیحات / کاربرد	وضعیت
۱	سرم ضد عقرب	Vial ۱۰ ml	Anti-venom-scorpion	گزیدگی عقرب	داروخانه مرکز
۲	سرم ضد مار	Vial ۵ ml	Anti-venom-snake	گزیدگی مارهای سمی	داروخانه مرکز
۳	فولینیک اسید	Amp ۱۰ mg/ml, ۵ ml	Calcium Folate	مسمومیت با متوتروکسات و متانول	-
۴	اتانول	Solu. -	Ethanol ۹۶% , ۴۰%	مسمومیت با متانول و اتیلن گلیکول	انبار دارویی
۵	فلومازینیل	Amp ۰.۱ mg/ml, ۵ml	Flumazenil	مسمومیت با بنزودیازپین ها	-
۶	فولیک اسید	Amp ۵ mg/ ml, ۱۰ ml	Folic acid	مسمومیت با متوتروکسات و متانول	-
۷	گلوکاگون	Vial ۱ mg/ ml, ۱ ml	Glucagon HCl	هایپوگلیسمی و مسمومیت با بلوک کننده های کانال کلسیم و بتا بلوکرها (دمای ۲-۸ درجه _)	ولیعصر
۸	هیدروکسوکوبالامین B۱۲	Amp ۱۰۰ mg/ ml, ۱ ml	Hydroxocobalamin	مسمومیت با سیانید و سدیم نیتروپروساید	ولیعصر
۹	اینترالیپید	Vial ۲۵۰ یا ۵۰۰ ml	Intravenous Intralipid ۲۰% Fat Emulsion (IFE)	ایست قلبی ناشی از ترکیبات محلول در چربی مانند: ضدافسردگی های سه حلقه ای، بلوک کننده های کانال کلسیم و بی حس کننده های موضعی	داروخانه مرکز
۱۰	متیلن بلو	Amp ۱۰ mg/ ml, ۱۰ ml	Methylene Blue	متهموگلوبینمی	-
۱۱	ان- استیل سیستئین	Amp ۲۰۰ mg/ml, ۱۰ ml	N-Acetylcysteine	مسمومیت با استامینوفن	داروخانه مرکز
۱۲	پلی اتیلن گلیکول	Bulk -	Polyethylene Glycol	برای انجام WBI (Whole Bowel Irrigation)	داروخانه مرکز
۱۳	پرالیدوکسیم (۲-PAM)	Vial ۱g	Pralidoxime Chloride	مسمومیت با ارگانو فسفاتها	ولیعصر

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۸/۸/۱۹	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۹/۸/۱۹
تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۸/۸/۱۹	تهیه کننده: دکتر نگار نفیسی
	نابید کننده: کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی