



## Automatic Stop Orders

### Medication Reassessment Alerts

Medication	Previously	Amendment	Rationale
Anti-infectives (oral)	10 day (s)	4 day (s)	Once MRA is reached, C&S, laboratory and diagnostic imaging report results should be available for re-assessment of most appropriate therapy, taking into account the clinical response of the patient.
Anti-infectives (parenteral)	4 day (s)	4 day (s)	Once MRA is reached, C&S, laboratory and diagnostic imaging report results should be available for re-assessment of most appropriate therapy, taking into account the clinical response of the patient. Re-assess the appropriateness of IV to PO conversion.
Anti-infectives (topical/eye/ear); nystatin oral liquid	10 day (s)	10 day (s)	Re-assess based on clinical response.
Antiretrovirals	No MRA	No MRA	Usually long term therapy.
Anticoagulants (low molecular weight heparins, heparin, fondaparinux)	7 day (s)	7 day (s)	No change at this time. Review MRA policy for anticoagulants after CPOE implementation
Warfarin	7 day (s)	14 day (s)	MRA extended based on physician feedback
Ketorolac (oral and parenteral)			Prevent renal and GI adverse events
Pantoprazole IV	3 day (s)	No MRA	Re-assess based on clinical response (ability to tolerate P)
Narcotics (Written Rx e.g.morphine, methadone)	3 day (s)	No MRA	Re-assess based on clinical response (acute vs. chronic therapy)
TPN	7 day (s)	No MRA	Re-assess based on clinical response (e.g. nutrition status, labs)

(s) = **Soft stop**: MRA notification is communicated 24 hours prior to the soft stop date being reached. The order remains active in the electronic chart, tasks are still generated for nursing and medication supply continues from pharmacy (until the order is discontinued).

**No MRA**: The order is considered valid until specifically discontinued, the patient is discharged, or 365 days have elapsed.

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۸/۹/۱۷	تهیه کننده: دکتر نگار نفیسی
تاریخ ابلاغ: ۹۸/۹/۱۷	تایید کننده: کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی
تاریخ بازنگری بعدی: ۹۹/۹/۱۷	



## داروهای خودبخود متوقف شونده

داروهای خودبخود متوقف شونده به داروهایی گفته می شود که به علت اثرات و عوارض خاصی، پس از گذشت مدت زمان معینی، مصرفشان نباید ادامه یابد و جهت ادامه تجویز باید از پزشک معالج دستور مجدد گرفته شود. هدف از تعریف این داروها ارزیابی دوره ای داروهای خاص و اطلاع آن به پزشک و گرفتن دستور جدید برای ادامه مصرف می باشد. از این طریق تیم درمان از تجویز ایمن داروی بیمار اطمینان حاصل می نماید.

ردیف	نام دارو	فواصل ارزیابی مجدد
۱	آنتی بیوتیکها (خوراکی)	۱۰ روز
۲	آنتی بیوتیکها (تزریقی)	۴ روز
۳	آنتی بیوتیکهای موضعی	۱۰ روز
۴	کورتیکواستروئیدها (بجز داروهای موضعی)	۷ روز
۵	فرآورده های چشمی (بجز در موارد گلوکوم و لوپریکانت)	۷ روز
۶	محلولهای استنشاقی بوسیله نبولایزر	۷ روز
۷	تمامی داروهای تغذیه ای غیر خوراکی (TPN)	۷ روز
۸	تنگ کننده عروق (چشمی و بینی)	۳ روز
۹	NSAIDs و مهارکننده های COX II	۱۰ روز
۱۰	داروهای ضد اسهال	۳ روز
۱۱	داروهای ضد یبوست	۱۴ روز
۱۲	کورتیکواستروئیدهای چشمی و خوراکی	۷ روز
۱۳	داروهای مخدر تزریقی (بجز متادون)	۳ روز
۱۴	هپارین و انوکسپارین	۷ روز
۱۵	وارفارین	۷ روز
۱۶	کتورولاک (تزریقی و برای بیماران بالای ۲ سال)	۲ روز
۱۷	پنتوپرازول تزریقی	۳ روز
۱۸	داروهایی که دستور مصرف آن ها در موقع الزام و ضرورت است در صورت عدم دستور جدید	۲۸ روز

تاریخ آخرین بازنگری: ۹۸/۹/۱۷	تهیه کننده: دکتر نگار نفیسی
تاریخ ابلاغ: ۹۸/۹/۱۷	تایید کننده: کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی
تاریخ بازنگری بعدی: ۹۹/۹/۱۷	