

- ✓ سکنه مغزی در اثر اختلال عمل ناگهانی مغز به علت قطع جریان خون بخشی از آن ایجاد می‌گردد.
- ✓ علت این عارضه اغلب بیماری های عروق مغزی است.

➤ علایم بالینی:

- علایم بالینی بسته به محل ضایعه و وسعت آن متفاوت است و معمولا عبارتند از:

✓ اختلال فعالیت ذهنی:

- ✓ به شکل افسردگی و عصبانیت و خشم، انزوا، فراموشی بروز می‌کند.

➤ عوامل خطر آفرین:

۱. **فشار خون بالا** که مهم ترین عامل محسوب میشود.
۲. دیابت
۳. بالا بودن کلسترول
۴. چاقی
۵. بیماری های قلبی مثل ضایعات دریچه ای و آریتمی ها
۶. قرص های ضد بارداری
۷. مصرف الکل
۸. مصرف نادرست داروها

✓ نقص حرکتی:

- سکنه مغزی باعث از بین رفتن کنترل حرکات ارادی میشود.
- **فلج نیمه بدن** شایع ترین نوع آن است.

✓ نقص حسی:

- مانند نقص در حس بینایی و شنوایی و لامسه

✓ اختلال عمل مثانه

- بعد از سکنه مغزی فرد ممکن است دچار بی اختیاری در ادرار گردد که در این حالت بیمار ممکن است پر شدن مثانه خود را حس نکند.





جمهوری اسلامی ایران

بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان

سکته مغزی CVA



تهیه و تنظیم: واحد آموزش

- استفاده به موقع از داروها طبق تجویز
- انجام فیزیوتراپی در بهبود وضعیت این بیماران لازم و موثر است.
- بیمار مبتلا به سکته مغزی به علت اختلال در حرکت و حس ممکن است دچار کاهش استحکام پوست شود. بنابراین پوست بدن بیمار باید تمیز و خشک بماند و حداقل هر ۲ ساعت یکبار وضعیت بدن بدن بیمار را تغییر دهید.

با آرزوی بهبودی و سلامتی روز افزون برای شما بیمار عزیز

مراقبت های لازم در این بیماران بطور خلاصه عبارتند از:

- در صورت نقص بینایی از سمتی که بیمار می بیند به او نزدیک شوید.
- به بیمار یاد بدهید برای جبران نقص بینایی خود را به همان سمت بچرخاند.
- وسایل مورد نیاز بیمار را همیشه در یک محل قرار بدهید بطوری که در دسترس بیمار باشد.
- از بیمار بخواهید مفاصل سمت سالم بدن را در دامنه حرکتی آن ورزش بدهد.
- وسایل کمکی برای راه رفتن را در اختیار بیمار قرار دهید و از حرکت بدون استفاده از وسایل و کمک دیگران خودداری شود.
- غذا را در سمت سالم دهان بگذارید.
- بیمار را مرتب نسبت به مکان و زمان و اشخاص آماده سازید از نشانه های کلامی و شنوایی استفاده کنید.