

بیمار گرامی شما در اثر گازگرفتگی و یا پنجه زدن توسط سگ/گره/انسان شده اید و به اورژانس مراجعه کرده اید.

با توجه به سابقه ی واکسیناسیون مناسب شما نیاز به تزریق واکسن ندارید ولی در صورتیکه سابقه ی واکسیناسیون شما نامشخص باشد، واکسن کزاز برای شما تزریق خواهد شد.

با توجه به معاینه و وضعیت زخم شما اگر نیاز به تزریق واکسن هاری داشته باشید نوبت اول آن را در این مرکز تزریق و جهت نوبت بعدی به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایید.

در حال حاضر با توجه به اینکه آسیب شما محدود به آسیب پوستی می باشد و اندام های داخلی و عروق و اعصاب، تاندون و عضلات در معاینات سالم هستند نیاز به بستری و جراحی نمی باشد و شما می توانید به منزل بازگردید.



پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

(۱) بخیه کردن برای زخم هایی بکار میرود که وسیع باشد و یا لبه های آن از همدیگر دور باشد و یا احتمال آلودگی و عفونت زیاد باشد به هر حال تشخیص آن بر عهده پزشک است و اعتماد کنید و نگران نباشید.



(۲) بخیه ها را تا ۲۴ ساعت خشک نگهدارید و بخیه های غیر قابل جذب را میتوانید بعد از ۲۴ ساعت با آب گرم و صابون به آرامی شستشو دهید و سپس به سرعت آنها را خشک کنید.

(۳) پس از شستشو میتوانید روی آن را با پماد تتراسایکلین و یا موپیروسین (در صورت تجویز و یا توصیه پزشک) بپوشانید.

(۴) زمان کشیدن بخیه ها را از پزشک خود سوال کنید، معمولا بخیه های صورت را ۴-۶ روز و بخیه های اندامها و پوست سر را ۱۰-۱۴ روز بعد کشیده میشوند.

(۵) توجه کنید تمامی زخم ها نیاز به پانسمان ندارند(بخصوص زخم های پوست سر و صورت) و پس از

شستشو و بخیه زدن بدون پانسمان رها میشوند، در این صورت اقدام به پانسمان آن نکنید.

(۶) در صورتیکه زخم شما بخیه نشده است، زخم خود را روزانه شستشو دهید (با سرم نمکی مخصوص شستشو)

(۷) در صورتیکه در هنگام ترخیص آنتی بیوتیک تجویز شده دارو را در زمان معین مصرف و حتما دوره درمان را کامل کنید.

(۸) جهت کاهش تورم ناحیه آسیب دیده در ۲۴ ساعت اول محل را بالاتر از سطح بدن نگه دارید.

(۹) خارش خفیف در روزهای ابتدایی طبیعی است و از خاراندن زخم خودداری شود، فقط پوست را ماساژ دهید.

(۱۰) وجود این زخم برای شما محدودیت غذایی ایجاد نمی کند فقط میتوانید برای بهبودی زخم از میوه ها و سبزیجات تازه و حاوی ویتامین ث استفاده نمایید.

(۱۱) اگر به حیوانی دسترسی دارید که به شما حمله کرده است، حیوان را در مکان امن به مدت حداقل ۱۰ روز حبس و نگهداری کنید و بروز هرگونه علائم و بیماری و رفتار غیرطبیعی او را به دامپزشک و یا مرکز بهداشت گزارش دهید.

(۱۲) اگر احتمالا باردار هستید و توسط گربه دچار آسیب شده اید حتما به پزشک خود اطلاع دهید.

(۱۳) جهت پیشگیری از بیماری هاری واکسن را در ۳-۵ نوبت باید تزریق کنید.



بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان
راهنمای بیماران

گاز گرفتگی توسط

حیوانات و انسان

Mammalian Bite/Human Bite



منبع: دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)

تهیه و تنظیم: الهام محمدی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

سال ۱۴۰۰

با آرزوی سلامتی برای شما مددجوی گرامی

جهت دسترسی به مطالب آموزش سلامت و دانلود
پمفلت های آموزش به بیمار به سایت
<https://arakmu.ac.ir/imamsadeghhos/fa>
واحد آموزش (آموزش بیمار) مراجعه نمایید.

۱۴) اگر توسط فردی دچار گازگرفتگی شده اید که قطعاً به بیماری واگیردار (ایدز و هپاتیت ب) مبتلا می باشد و یا اعتیاد دارد، حتماً به پزشک خود اطلاع دهید. (تا در صورت امکان واکسن هپاتیت ب برای شما تزریق شود).

در صورت بروز هر یک از علائم زیر به پزشک و یا اورژانس مراجعه نمایید:

- درد و تورم شدید در محل آسیب
 - خروج چرک یا ترشحات سبز رنگ
 - تغییر رنگ و یا سیاه شدن زخم
 - خونریزی مجدد زخم
 - محدودیت حرکت در اندام آسیب دیده
- در صورت بروز هر یک از علائم زیر در سه ماه آینده (حتی در صورت بهبودی زخم) به پزشک مراجعه کنید:

۱. بی حسی و گزگز شدن اندام
۲. پرش اندام و یا تکان شدید بی اختیار آن
۳. سردرد شدید و ناگهانی
۴. اختلال در تکلم
۵. درد و گرفتگی شدید عضلات