



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۴/۸۴۶۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها  
مقام معظم رهبری

## معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

**موضوع:** معاونت های بهداشتی دانشگاه ها - تزریق واکسن کووید-۱۹ پس از ابتلا به بیماری

با سلام و احترام

با توجه به استعلام معاونت های محترم بهداشتی دانشگاه ها در خصوص تزریق واکسن کووید-۱۹ پس از

ابتلا به بیماری ، مصوبات کمیته فنی کشوری واکسیناسیون کرونا به شرح ذیل به استحضار می رسد:

- در موارد ابتلای قطعی به کووید -۱۹ پس از دریافت دز اول و در فاصله نوبت های اول و دوم ، تزریق نوبت دوم حداقل یک ماه بعد از بهبودی کامل انجام می شود.
- در افراد بدون سابقه واکسیناسیون که سابقه ابتلای قطعی به کووید -۱۹ دارند ، تجویز دو نوبت واکسن حداقل یک ماه بعد از بهبودی کامل انجام می شود.

**دکتر محمدمهدی گویا**  
ریس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر