

اطلاعیه سازمان غذا و دارو و هشدار در خصوص عدم مصرف سموم آفت‌کش کشاورزی جهت درمان شپش سر

بر اساس گزارشات دریافتی از همکاران محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، متأسفانه چند مورد مسمومیت حاد و حتی مرگ ناشی از استفاده موضعی سموم آفت‌کش کشاورزی (دیازینون از دسته سموم ارگانوفسفره) به منظور درمان شپش سر کودکان مشاهده شده است.

در همین راستا، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو، هشدار می دهد در صورت برخورد با افراد مبتلا به شپش، خصوصاً کودکان که این آلودگی در ایشان شایع تر است، ضمن مراجعه به پزشک و داروساز و تهیه شامپوها و لوسیون‌های مخصوص درمان شپش موجود در داروخانه‌ها و استفاده بر اساس توصیه های اعلام شده، به هیچ عنوان از سموم دفع آفات و حشرات مانند سموم کشاورزی و یا سموم خانگی، برای دفع شپش استفاده نکنید. سموم دفع آفات نباتی مورد استفاده در کشاورزی، دارای سمیت بالایی می باشند و شدیداً از طریق پوست قابل جذب هستند و تماس پوستی با این سموم می تواند منجر به مسمومیت و مرگ شود. به طوری که حتی از کشاورزان درخواست می شود ضمن انجام سم پاشی مزارع، از دستکش لاستیکی، کفش لاستیکی جلو بسته و ماسک حفاظت کننده استفاده نمایند تا از بروز مسمومیت ناشی از تنفس و یا تماس سم با پوست پیشگیری شود.

ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه غم انگیز، از عموم مردم خصوصاً ساکنین مناطق روستایی و کشاورزی که به سموم دفع آفات دسترسی دارند، درخواست می شود توصیه های پیشگیرانه را جدی بگیرند و برای درمان شپش و موارد مشابه، فقط به پزشک و داروساز مراجعه نمایند و به هیچ عنوان از سموم دفع آفات و سموم خانگی جهت درمان شپش استفاده نشود.

دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت

سازمان غذا و دارو

تابستان ۱۴۰۱