



مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر

بخش تصویر برداری

اقدامات قبل از انجام سی تی اسکن شکم با کنتراست خوراکی و تزریقی :

- ✓ ۲۴ ساعت قبل غذای جامد و نفاخ میل نشود ، سوپ صاف شده میل شود
- ✓ روز قبل از سی تی بعد از شام سبک ، دو عدد شیشه روغن کرچک ساعت ۸ شب میل شود
- ✓ ساعت ۹ شب چهار عدد قرص بیزاکودیل + ۴ عدد قرص دایمیتیکون به فاصله هر ده دقیقه یک عدد از هر کدام مصرف شود .
- ✓ صبح ناشتا به بخش سی تی اسکن مراجعه کند و مثانه پر باشد .
- ✓ در صورت مصرف متفورمین ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از آزمون دارو باید قطع شود .

اقدامات قبل از انجام سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق :

- ✓ به آمادگی روده ای و روغن کرچک نیاز ندارد فقط ۲-۳ ساعت ناشتا بودن کافی است

آدرس : خیابان شهید شیرودی ، میدان پرستار مرکز آموزشی و درمانی امیر کبیر - بخش تصویر برداری : ۸-۳۳۱۳۵۰۷۵