


نارسایی کلیه

مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)

واحدآموزش پرستاری



بهار ۱۴۰۳

<http://portal.arakmu.ir>

کلیه هایکی از اعضای حیاتی و مهم بدن می باشند که وظایف متعددی بر عهده دارند مانند:

- * تمیز کردن خون از مواد زاید حاصل از سوخت و ساز بدن
- * دفع سموم و دارو ها از بدن
- * کمک به تنظیم فشار خون
- * تنظیم مایعات والکترولیت و اسید و باز بدن
- * ترشح هورمون ها ای موثر در تولید گلوبولهای قرمز و موثر در تنظیم کلسیم بدن

کلیه ها رامی توان به پالایشگاهی تشییه کرد که در تمام ساعت شبانه روز بدون وقه و منظم در حال کار کردن می باشند. زمانی که کلیه ها قادر به انجام وظایف خود نباشند و به هر علتی عملکردشان را ازدست دهند، نارسایی کلیه رخ می دهد که براساس سیر بیماری ممکن است به صورت حاد یا مزمن باشد.

علل نارسایی کلیه

علل زیادی میتواند سبب نارسایی کلیه ها شود. امروزه شایع ترین علل این بیماری دیابت و فشار خون میباشد به هر علتی خون رسانی کافی به کلیه ها صورت نگیردیا نفرون ها (واحد عملکردی کلیه) از کار یافتهند، یا مسیر های دفع ادرار مسدود شوند، نارسایی کلیه رخ می دهد .

شش علامت هشداردهنده احتمال وقوع نارسایی کلیه

- * سوزش ادرار و یا اشکال در هنگام ادرار کردن تکرر ادرار بويژه در شب
- * ادرار خونی یا سیاه رنگ
- * تورم دور چشم ، دستها و پاهای و گاهی تمام بدن
- * درد پهلو و یا کمر درست زیر لبه ای دندنه ها
- * افزایش فشار خون

ساير علامیم نارسایی کلیه عبارتند از:

- * علائم گوارشی مانند کم اشتھایی، تهوع و استفراغ.
- * خونریزی از بینی، خونریزی گوارشی، کبودی زودرس بدن با ضربه های جزئی.
- * احساس ضعف و خستگی که یکی از علل آن کم خونی
- * مشکلات قلبی_عروقی مانند بی نظمی در ضربان قلب، تصلب شرائین و تورم پرده های اطراف قلب.
- * احساس تنگی نفس که می تواند به علت مشکلات قلبی یا تجمع مایع در ریه باشد.
- * مشکلات استخوانی مثل نرمی استخوان
- * کم خونی، خارش

۶. کالری دریافتی خود را کنترل کنید:

کالری مورد نیاز بیمار با غذاهای غنی از کربوهیدرات تأمین میشود (یعنی در یک رژیم غنی از کربوهیدرات، پروتئین برای نیازهای انرژی مصرف نشده و به منظور رشد و ترمیم بافتی ذخیره میشود).

۷. مکمل های ویتامین و مواد معدنی را فقط در صورت تجویز پزشک مصرف کنید.

چهار توصیه مهم برای پیشگیری از نارسایی کلیه :

- درمان گلو درد های چرکی را دقیق و صحیح انجام دهید.
- در صورت ابتلا به دیابت قندی، قندخون را به دقت کنترل کنید.
- در صورت ابتلا به فشار خون بالا، به توصیه های پزشکان برای کنترل دقیق فشار خون توجه کنید.
- در صورت ابتلا به سنگ های ادراری، روزانه حداقل ۸ لیوان مایعات بنوشید.

۲. میزان دریافت پتاسیم را کنترل کنید:

پتاسیم بر چگونگی ضربان قلب شما تأثیر می گذارد. کلیه های سالم میزان پتاسیم در خون را به گونه ای تنظیم می کند که ضربان قلب یکنواخت باشد. دریافت زیاد پتاسیم می تواند برای قلب بسیار خطرناک باشد و حتی می تواند منجر به مرگ شود. از جمله غذاهای حاوی مقادیر زیاد پتاسیم: موز، کیوی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، زردآلو، خرما، شیر، کشمش، اسفناج، کدو حلوایی آب میوه و عصاره ای مرکبات، قهوه ۵.

۳. میزان دریافت فسفر را کنترل کنید:

از جمله مواد حاوی فسفر شیر و پنیر، معزه ها (بادام، گردو) می باشد.

۴. از پروتئین های با کیفیت بالا استفاده کنید:

پروتئین های با کیفیت بالا از گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ به ویژه سفیده ای تخم مرغ به دست می آید.

۵. میزان دریافت سدیم را محدود کنید:

از مصرف غذاهای کنسروی و بسته بندی شده در قوطی و غذاهای منجمد خودداری کنید. برای مزه دار کردن غذا به جای نمک از سبزیجات معطر استفاده کنید

در صورت مشاهده هر یک از علایم هشدار دهنده، سریعاً به پزشک خود مراجعه کنید تا آزمایش های تشخیصی (اندازه گیری میزان اوره کراتین خون، آزمایش ادرار، سونو گرافی، اسکن و...) را برای شما انجام دهد.

تدایر طبی

کلیه توانایی قابل ملاحظه ای برای رهایی از آسیب دارد. بنابر این، اهداف درمان پیش گیری از عوارض تازمانی است که ترمیم بافت کلیوی و بازگشت کارکرد کلیوی صورت پذیرند. که شامل: رفع کردن علت زمینه ای؛ حفظ تعادل مایع؛ اجتناب از مصرف زیاد مایع در مرحله آخر نارسایی کلیه، درمان جایگزین دیالیز و پیوند کلیه می باشد.

درمان تغذیه ای

۱. دریافت مایعات خود را محدود کنید:

مایعات بیش از حد بر فشار خون شما تأثیر گذاشته و باعث ایجاد تورم و افزایش وزن می شود و کار قلب را سخت تر می کند. برای غله بر تشنگی خود آبمیوه ها را به صورت مکعبی در ظروف مخصوص آن، در فریزر منجمد کنید و مانند یخمک آن را بخورید. برای نوشیدن مایعات از فنجان های کوچک استفاده کنید. معمولاً میزان مایع مجاز ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر بیش از برون ده ادراری ۲۴ ساعته ای قبل است.