


پمفت آموزشی شماره (۶۵)

پیس میکر دائم

مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)

واحد آموزش پرستاری



علایم برادی کاردی:

سرگیجه، خستگی، تنگی نفس، بریده بریده حرف زدن می باشد.

پیس میکر چیست؟

مجموعه ضربان ساز شامل پیس میکر و لیدهای مربوطه است که پیس میکر خود شامل باتری و مدار الکترونیکی می باشد. لیدها ارتباط الکتریکی بین پیس میکر و بافت قلب را بیجاد می کنند. پیس میکر ضربان های منظم و متوالی را از طریق لید به قلب می فرستد و این کار زمانی انجام می دهد که ضربان قلب دچار وقفه یا بیج نظمی شده باشد و یا تعداد ضربان قلب بسیار کم باشد و زمانی که ضربان طبیعی راحس می کند هیچ گونه ضربانی صادر نمی کند، که این امر باعث بهبودی علایم از برادی کاردی نظیر سرگیجه، تنگی نفس و خستگی می شود.

چند نوع پیس میکر وجود دارد؟

باتوجه به شرایط قلب شما پیشک تعداد حفره های قلب را که نیاز به پیس میکر دارند تعیین می کند. پیس میکر ها را به صورت تک حفره ای، دو حفره ای و سه حفره ای طراحی می کند.

<http://portalarakmu.ir>

بهار ۱۴۰۳

مشخصات پیس میکر:
بعداز تعییه پیس میکر شرکت یک کارت شناسایی به شما می دهد شما یک وسیله پزشکی درین دارید، این کارت راهنمایی همراه خود داشته باشد. این کارت دریگیری های دوره ای، هنگام عبور از سیستم امنیتی فروگاه و در اورژانس های پزشکی بسیار بالارزش است. کارت شناسایی حاوی اطلاعات زیر می باشد:

- نام، آدرس و شماره تلفن دارنده پیس میکر
- مدل و شماره سریال پیس میکر و لیدهای مربوطه و تاریخ تعییه آنها
- نام و شماره تلفن پزشک معالج

مواقبت های بعد از تعییه پیس میکر:

- بعداز تعییه پیس میکر پزشک یا پرستار تان آموزش های لازم را به شما می دهد که شامل:
 ۱. ازبالا بردن دست درسمتی که پیس میکر کار گذاشته شده تاچندین روز بعد از تعییه آن پرهیز کنید.
 ۲. از فشار مستقیم روی پیس میکر (مانند خوابیدن روی آن، فشار دادن یا ور رفتن با آن) جدا پرهیز نمایید.
 ۳. از پوشیدن لباسهای تنگ که باعث فشار زیاد به زخم و زنر اتور می شود احتساب کنید.
 ۴. محل برش جراحی را خشک و تمیز نگه دارید، هیچ گونه ماده ای روی زخم مالیده نشود و هر روز شستشو شود
 ۵. در صورت مشاهده هر یک از علایم زیر سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید:

علایم عفونت در محل جراحی (شامل تب توام با تغییر رنگ یا قرمزی، التهاب و تورم درد یا ترشح در محل برش جراحی)، سرگیجه، تنگی نفس، گیجی و سطح هوشیاری، بریده بریده حرف زدن، ضعف یا خستگی مداوم، درد قفسه سینه، سکسکه طولانی مدت، ورم ساقها و بازوها و پاها، تپش قلب.

فعالیت روزانه :

بعداز تایید پزشک معالج و هنگامی که شرایط شما روبه بهبودی باشد، می توانید به تدریج به زندگی و فعالیت عادی خود باز گردید ولی به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱. اجتناب از فعالیت شدید در بازوها و شانه ها و لیند کردن اجسام سنگین بیش از ۵-۲,۵ کیلوگرم در ۶ هفته اول بعد از جراحی زیرا احتمال جابجایی لید را فراش می دهد. بعد از عمل شانه رامی تواند در اطراف حرکت دهد اما از سطح شانه بالاتر نرود.
۲. از برخورد های خشن و درگیری پرهیز کنید ، بهتر است ازاسکی و فوتبال که دارای حرکات سخت و خشن می باشد پرهیز شود.
۳. هنگام شکار از قراردادن قنداق تنفسگ روی شانه ای که پیس میکر در آن جا قرار دارد اجتناب کنید.
۴. از هر حرکتی که موجب وارد آمدن فشار به دستگاه پیس میکر شما شود، اجتناب کنید.

دارو:

پزشک شما معمولاً داروهایی راهراه پیس میکر جهت کمک به تنظیم ضربان قلب شما تجویز می کند.

پیگیری های دوره ای پیس میکر:

پیگیری های دوره ای جهت بررسی تنظیمات پیس میکر و شرایط باتری ضروری است. تعداد دفعات بررسی بستگی به نوع پیس میکر، لید و وضعیت پزشکی شما دارد، ولی معمولاً کنترل پیس میکر سالی دوبار نیاز است که با توجه به شرایط پزشکی شما ممکن است تغییر کند.

راهنمایی هایی برای افرادی که پیس میکر دارند:
توجه: قبل از انجام هرگونه اقدام درمانی پزشک ، دندانپزشک یا کارشناس مربوطه را ازداشت پیس میکر مطلع کنید.

در شرایط عادی از نزدیک شدن به آنها اجتناب کنید: MRI

پیس میکر سیستم های امنیتی: اکثر افراد دارای پیس میکر می توانند به راحتی بارعايت موارد احتیاط سفر کنند.

اتومبیل: کمریند اینمی ممکن است باعث ناراحتی شما شود. قراردادن حolle بین کمریند اینمی و پیس میکر در چند هفته اول راحتی شمارایشتر می کند.

سیستم های امنیتی فروگاه: کارت شناسایی خود را نشان دهید. پیس میکر تحت تاثیر این سیستم قرار نمی گیرد ولی قاب فلزی آن باعث به صدا در آمدن زنگ خطر این سیستم ها می شود. در خواست بازرسی بدنی کنید.

سیستمهای امنیتی فروشگاه ها و کتابخانه ها : برای جلوگیری از تاثیر این سیستم ها روی پیس میکر به آرامی از کنار آنها عبور کنید. نزدیک یا کنار آنها توقف نکنید.

پیس می کر و تلفن همراه: به طور کلی توصیه شده است که بین تلفن همراه و دستگاه پیس میکر حداقل ۱۸-۲۰ سانتی متر فاصله حفظ شود تا از احتمال ایجاد اختلال در پیس میکر جلوگیری شود. هرگز تلفن همراه خود را در جیب بغل پیراهن خود حمل نکنید. گوشی رابربروی گوشی بگیرید که در طرف مخالف محل جایگیری پیس میکر باشد.

از مکالمه طولانی با تلفن همراه خودداری کنید.