

نشانه های خونریزی

خونریزی گوارشی به ۵ شکل زیر می تواند ظاهر شود:

۱) استفراغ خونی روشن با موادی با زمینه قهوه ای که نشانه خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش است.

۲) مدفوع قیری و بدبو

۳) خون قرمز روشن یا خرمایی مایل به قرمز

۴) خونریزی مخفی که در آزمایش مد فوع تشخیص داده می شود.


۵) عالیم از دست دادن خون یا کم خونی مانند سیاهی رفتن چشم، سنکوپ، درد قفسه سینه یا تنگی نفس، پوست سرد، درد شدید شکمی، افزایش درجه حرارت.

نکته: یکی از علل شایع خونریزی های گوارشی، استفاده بی رویه از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثل مفنامیک اسید، دیکلوفناک، بروفن، پیروکسیکام و... است. به همین دلیل این داروها باید فقط با مشاوره پزشک و به مقدار لازم مصرف شوند

درمان: زمانی که بیمار، با خونریزی گوارشی مراجعه می کند، پس از ثابت کردن عالیم حیاتی بیمار از طریق مایع درمانی مناسب، برای بیمار لوله معده گذاشته می شود، شستشوی معده انجام می شود و پس از آن برای تشخیص و درمان خونریزی، بسته به محل خونریزی آندوسکوپی و کولونوسکوپی انجام می شود. لازم به ذکر است که گاهی اوقات نیاز به جراحی می باشد

خونریزی های گوارشی

زخم گوارشی عبارت است از زخمی که در دیواره مخاطی معده، پیلو، دوازدهه یا مری ایجاد می شود. بر اساس محل بروز نامگذاری می شود. یعنی به صورت زخم معده، زخم دوازدهه یا مری و یا اینکه ممکن است در مجموع به نام زخم پیتیک خوانده شود.



عوامل مستعد کننده

سابقه خانوادگی

گروه خونی O

صرف الکل و استعمال دخانیات

استرس بالا


استفاده طولانی مدت از داروهای ضد التهاب



مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)

واحد آموزش پرستاری

خونریزی های گوارشی



۱۴۰۳
بهار

سعی کنید تعداد و عده های غذایی را افزایش داده اما حجم غذا را در هر وعده به حداقل برسانید.
از خوردن سس گوجه فرنگی، میوه و سبزی های ترش و شور جدا خودداری کنید.

در صورت داشتن اضافه وزن، وزن خود را کاهش دهید.

دخانیات و الکل مصرف نکنید.

بالافصله پس از خوردن غذا دراز نکشید و هنگام خوایدن از بالش بلندتری استفاده کنید.

صرف نوشیدنیهای گازدار، شکلات و غذاهای چاشنی دارو معطر مثل پیتزا و پرتقال را محدود کنید.
اظطراب خود را کاهش دهید.

غذای خود را در محیطی آرام و فواصل منظم میل کنید

به مدت یکسال تحت نظر زشک باشید.



موارد زیر را در صورت مشاهده گزارش دهید:

۱) دهان تشنه و خشک، ضعف، رخوت (نشان دهنده سدیم بالا ناشی از مقادیر زیاد از حد آنتی اسیدهای حاوی سدیم) و یا التهاب انتهایاها و بالا رفتن وزن (در اثر احتباس آب)

۲) بیوستی که با افزایش مصرف مایع و یا تعویض با یک آنتی اسید حاوی منیزیم بر طرف نمی شود.

۳) اسهالی که با داروهای ضد اسهال و یا تعویض با آنتی اسید حاوی آلومینیوم بر طرف نمی شود.



رژیم غذایی در بیمارانی که از زخم معده دارند:

تا حد امکان از خوردن غذاهای اماده یا همان فست فودها اجتناب کنید.

صرف میان وعده های ناسالمی چون چیپس و پیک، غذاهای تند، شور و پر ادویه را به حداقل برسانید.

از مصرف چای فراوان و پررنگ پرهیزید و غذاهای چرب نخورید.

هیدروکسیدمنیزیم، هیدروکسیدآلومینیوم، امپرازول، رانیتیدین، سایمتیدین، سوکرافیت و بیسموت در درمان زخم معده به کار می رود.

کات زیر را رعایت کنید

لف) داروها را طبق دستور مصرف کنید.

ب) در صورت امکان سوسپانسیونهای داروی ضد اسید را ترجیحاً به جای قرصها مصرف نمایید (سوسپانسیونها سید معده را موثرتر خنثی می کنند)

ج) قرص هایی را که قابل جویدن است کاملاً بجوید.

د) قبل از مصرف سوسپانسیونهای آنتی اسید، آنها را به خوبی تکان دهید.

، ترکیبات سدیمی داروهای ضد اسید را بررسی کنید و ز مصرف فراورده هایی که سدیم بالایی دارند در صورت ابتلاء به فشار خون بالا یا داشتن رژیم غذایی محدود، از سدیم خودداری کنید.

ی) در صورتی که اسهال یا بیوست وجود دارد؛ آنتی سیدهای حاوی آلومینیوم (امفوژل، الترناژل) و آنتی سیدهای حاوی منیزیم (شیر منیزی، مگ-اکس) را به صورت دوره های متناوب مصرف کنید یا از هیدروکسید آلومینیوم و منیزیم استفاده نمایید. از مصرف آنتی اسید های حاوی کلسیم بالا (تیترالاک، تامس) و یکربنات سدیم (جوش شیرین مخصوص پخت و بز، آلکاسلتزر، سودامینت) خودداری کنید.

ح) انتظار داشته باشید که مدفوع ممکن است متمایل