



مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

واحد آموزش پرستاری

EPS

الکتروفیزیولوژی



پمفلت آموزشی شماره ۱۰۹

<http://portal.arakmu.ir>

بهار ۱۴۰۳

مراقبت های بعد از عمل:

- از حرکت پا تا مدت ۶ - ۸ ساعت بعد از عمل خودداری کنید.
- کیسه شن به مدت ۲ - ۳ ساعت در ناحیه عمل قرار گیرد.
- بیمار از نظر خونریزی ناحیه عمل مورد بررسی قرار گیرد. (توسط پرستار بخش)
- روز بعد از عمل می توانید استحمام کنید.
- یک ساعت بعد از عمل می توانید غذا بخورید.

منبع: برونوسودارت

ترجمه: ژاله محمد علیا

تعریف:

یک روش تشخیصی عملکرد سیستم هدایتی قلب و بی نظمی های قلب می باشد.

روش انجام:

یک روش کم خطر محسوب می شود که در بخش آنژیوگرافی از طریق سیاهرگ ناحیه کشاله ران انجام می شود. نیاز به بیهوشی عمومی ندارد و از بی حسی موضعی استفاده می شود.

سه تا پنج روز روز قبل از عمل داروهای آنتی اریتمی ASA و آنتی کوآگولانت با دستور پزشک معالج قطع گردد ، یکروز قبل از عمل بستری می شود و آزمایشات لازم انجام می شود. بیمار از شب قبل از عمل ناشتا می باشد.