

ارزیابی، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم (ویژه پزشک)

بررسی عالیم کودک مصدوم (Priority)

تشخیص نوع درمان

ارزیابی

*

حادثه یا سایر حالات جراحی فوری

- شرح حال اتفاق حادثه یا
- زخم و خونریزی خارجی یا
- عدم توانایی در حرکت اندام یا سفتی شکم

- سوختگی

- شرح حال سوختگی یا سرمادگی یا
- پوست با درجات مختلف سوختگی

* مسمومیت

- ناخوشی ناگهانی غیرقابل توضیح یا
- شرح حال مسمومیت

- گزش و گزیدگی

- شرح حال گزش و گزیدگی
- درد شدید، تورم و تغییر رنگ محل زخم
- علائم عمومی شامل شوک، استفراغ و سرد درد

تخلیه سم از معده در یک ساعت اول بجز کودک غیرهوشیار (بعدازتابیاسیون و حفظ راههای هوایی) و بلع مواد سوزاننده یا فراورده های نفتی

علایم هیپوگلیسمی را در کودک کنترل کنید

ایجاد استفراغ بالپیکا در کودکان زیر 6 ماه کنتراندیکه است

هرگز از نمک برای تحریک استفراغ استفاده نکنید زیرا می تواند کشنده باشد

اگر شرح حال بلع مواد سوزاننده یا فراورده های نفتی را دارد، اقدامات صفحه 4 رانجام دهید

اگرکودک با شرح حال بلع مواد حشره کش و یا سموم گیاهی مراجعه کرده است اقدامات صفحه 5 رانجام دهید

اگر شرح حال مسمومیت دارویی و مواد مخدود را دارد اقدامات صفحه 6 رانجام دهید

اندام دچار گزش یا گزیدگی (کاهش حرکت و جذب سم) را بی حرکت کنید و آن را در سطح پایین تراز قلب نگه دارید.

زخم را تمیز کنید و از تورنیکه استفاده نکنید.

روی محل گزیدگی رابرش ندهید و یادهان زهر رامکش نکنید.

اگر یا شرح حال گزش حشرات، عقرب و رتیل یا گاز گرفتگی مراجعه کرده است اقدامات صفحه 8 رانجام دهید

اگرکودک با شرح حال مارگزیدگی مراجعه کرده است اقدامات صفحه 7 رانجام دهید

* قبل از درمان کودک، او را از نظر ترومما به سروگردان کنترل کنید. و در صورت وجود احتمال صدمه به نخاع گردنی، گردن کودک را حرکت ندهید.

اگر کودک به علت حادثه یا سایر علائم جراحی فوری مراجعه کرده است :

تشخیص نوع درمان	طبقه بندی	نشانه ها
<ul style="list-style-type: none"> درصورت وجود خونریزی با یک گاز استریل روی محل خونریزی فشار وارد کنید تا خونریزی کنترل شود (متوقف شود) درصورت نیاز، بالای محل خونریزی را بیندید و تاحدی فشار داده شود که قسمت انتهایی زخم تیره رنگ نشود با آتل ، عضوآسیب دیده را بی حرکت نگهدارید به نزدیک ترین بیمارستان فوری ارجاع دهید 	صدمه شدید	<ul style="list-style-type: none"> نشانه های خطر یا خونریزی شدید یا عدم توانایی در حرکت دادن اندام ها یا رنگ پریدگی یا تندرنس شکم یا تندرنس اندام ها یا ستون فقرات یا عدم وجود نبض در عضو
<ul style="list-style-type: none"> با سرم نرمال سالین زخم را شوئید. بادقت زخم را تمیز کنید (با قیمانده اشیاء، لخته های خون، بافت های مرده و بدشکل گرفته را (در زخم های آلوده) بردارید. با یک آنتی بیوتیک (سفالکسین یا کلوگراسیلین) مناسب به مدت 4 روز درمان کنید. تابهودزخم، روزانه پاسمنان را تعویض کنید. وضعیت واکسیناسیون کراز را بررسی کنید به مراقب کودک بگویید چه موقع برگرددد. 	صدمه متوسط	<ul style="list-style-type: none"> وجود حداقل یک یافته زیر: زخم های با عالیم عفونت * زخم های عمیق و آلوده زخم های چرکی
<ul style="list-style-type: none"> به متخصص کودکان برای بررسی بیشتر ارجاع دهید. 	احتمال صدمه غیر حادثه ای	<ul style="list-style-type: none"> خون مردگی های متعدد در مراحل مختلف بهبود یا سوختگی در محل های غیر معمول مانند باسن ها
<ul style="list-style-type: none"> روزانه زخم را برای علائم عفونت کنترل کنید. تابهودزخم، روزانه یکبار آنرا با آب تمیز شستشو دهید . وضعیت واکسیناسیون کراز را بررسی کنید. به مراقب کودک بگویید چه موقع فوری برگردد. 	صدمه خفیف	<ul style="list-style-type: none"> حوادث بدون خونریزی یا خونریزی اندک


لمس کنید:	مشاهده کنید:
<ul style="list-style-type: none"> تندرنس شکم تندرنس اندامها و ستون مهره ها نبض غیر طبیعی 	<ul style="list-style-type: none"> نشانه های خطر رنگ پریدگی خونریزی خارجی علائم عفونت موضعی * عدم توانایی در حرکت دادن اندام

* علائم عفونت موضعی شامل قرمزی، درد موضعی، تورم و گرمی است
(با یابدون چرک یا تاب)

اگر کودک با سابقه سوختگی مراجعه کرده است :

تشخیص نوع درمان	طبقه بندی	نشانه ها
<p>در صورت نیاز، اقدامات احیا(ABC) را انجام دهید</p> <p>برای پیشگیری از پایین آمدن قند خون ، اقدامات لازم را انجام دهید</p> <p>در سوختگی استنشاقی ، صورت و سوختگی بیش از 15% کودک NPO شود</p> <p>لیاس های فشاری و تنگ خارج شود و مناطقی که لیاس به بدن جسمیده از اطراف با قیچی جدا شود و نیاید کنده شود</p> <p>سطح سوختگی را با آب سرد نشوید</p> <p>برای احتیاب از کاهش دمای بدن از حوله یا ملحفه تمیز و خشک استفاده کنید</p> <p>ویمار را با بتو بیوشانید.</p> <p>بزای کاهش درد شیاف استامینوفن بدھید</p> <p>هرگز تاول هاراپاره نکنید(ترکانید) بجز سرمادگی روی سطح زخم کره روغن و حتی یمادسوختگی مالیده نشود</p> <p>انتی بیوتیک ندھید</p> <p>در سوختگی شیمیابی، الکتریکی، استنشاقی ، باقی و سرمادگی اقدامات اولیه(صراحت) اراده صورت امکان انجام وسیس ارجاع دهید</p> <p>یس از stable شدن کودک راهه بیمارستان فوري ارجاع دهید</p> <p>در صورتیکه فاصله مراجعته بیمار تا محل بستره بیش از ۵ ساعت است علاوه بر موارد فوق ، اقدامات تکمیلی(صراحت) ارجام دهید</p>	سوختگی شدید	<ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • سوختگی با ضخامت %10 نسبی(درجه II) • و بیشتر در کمتر از 2 سال و 15% و بیشتر بالای 2 سال • سوختگی عمیق (درجه III) 2% و بیشتر • سوختگی صورت، دست (foot) (hand)، سطح مفصل، اندام تناسلی و سوختگی حلق وی • سوختگی باریق ولتاژ بالا • سوختگی شیمیابی • سوختگی استنشاقی • سرمادگی های همراه (شکستگی) • آسیب های همراه (شکستگی) • سایه بیماری مزمن • احتمال child abuse
<p>برای کاهش دراستامینوفن بدھید.</p> <p> محل و اطراف سوختگی را با آب تمیز و نرمال سالین سرد (15-8 درجه سانتیگراد) شسته شود</p> <p>هرگز تاول هاراپاره نکنید(ترکانید)</p> <p>روی سطح سوختگی یخ نگذارید</p> <p>از روغن ، کره و... برای پوشش زخم استفاده نکنید</p> <p>انتی بیوتیک ندھید و یماد کورتون دار استفاده نشود</p> <p>سطح زخم را با پماد ضعیف (باسیتراسین ، نیتروفورازون ، جنتامایسین و...) بیوشانید و روی آن گازاستریل بگذارید.</p> <p>به مادر آموزش دهید روزی 2 بار زخم را با صابون یا شامبوی بچه شتشو دهد و زخم را با همان پماد بیوشاند</p> <p>یه مادر توصیه کنید صورت بروزت ، بیقراری، استفراغ ، تشنجه و نخورد غذا فوری مراجعة نماید.</p> <p>جهت پیگیری زخم سوختگی، دوروز بعد مراجعة کند.</p> <p>وضعیت این من سازی کزان را بررسی کنید</p>	سوختگی متوسط	<ul style="list-style-type: none"> • سوختگی با ضخامت نسبی(درجه II) کمتر از 10% در کمتر از 2 سال و کمتر از 15% بالای 2 سال • سوختگی عمیق (درجه III) کمتر از 2%
<p>برای کاهش دراستامینوفن بدھید.</p> <p>مایعات بیشتر به کودک داده شود</p> <p>یه مادر توصیه کنید محل سوختگی را روزانه تمیز کند. و جهت مرتبط و چرب نگه داشتن یوست از کرمهای مرتبط کننده(aloe vera) یا اکسیدروی استفاده کند</p> <p>یه مادر توصیه کنید صورت بروزت ، تشديد دردویا تغییر رنگ سوختگی مراجعة نماید.</p>	سوختگی خفیف	<ul style="list-style-type: none"> • سوختگی سطحی (درجه I) بدون تاول همراه با درد

سوال کنید:	نگاه کنید، معاینه کنید:
<ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • عامل بروز • سوختگی چیست ؟ • (شعله ، مایعات داغ ، شیمیابی، الکتریکی و...) • آسیب های همراه (مثل شکستگی) • احتمال child abuse • مزمن 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع سوختگی ها (درجه I,II,III) • درجه II (سوختگی با ضخامت نسبی) • درجه III (سوختگی عمیق) • محل و درصد سوختگی (درجه II و III) • رامطابق جدول زیر مشخص کنید • نشانه های عفونت در سطح سوختگی



سن به سال	مناطق مشخص شده در تصویر	
9-4 سال	تا یک سالگی	4-1 سال
6/5	8/5	9/5
8/5	6/5	5/5

A نیمی از سر
B یک ران

نهاسوختگی های شدید و متوسط (درجه II و III) را در نظر بگیرید.
ارسخی ساده بسته صرف نظر کنید.

کف دست کودکان معادل یک درصد سطح بدن آنهاست و در ارزیابی وسعت سوختگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اقدامات اولیه در سوختگی های اختصاصی و سرمازدگی:

اقدامات سوختگی شیمیایی:

- » پاک کردن مواد شیمیایی از پوست
- » شستشو با مقادیر زیاد آب مقطر یانه مال سالین یا آب لوله کشی
- در مورد مواد اسیدی 60-30 دقیقه
- در مورد مواد قلیایی 4-2 ساعت
- » درموردتیماس با جسم حداقل زمان شستشو 20 دقیقه است
- » به هیچ عنوان از مواد خنثی کننده استفاده نشود
- » تاولها حتماً برداشته شود و زیر آنها سیستشو داده شود
- » در صورت درد از مسکن تزریقی استفاده شود

اقدامات اولیه برای سرمازدگی

- » خارج کردن همه لباس های خیس از بدن
- » باز کردن تمام لباس های فشاری مثل دستکش ، پوتین ، کمریند ، جوراب و .
- » قرار دادن عضو صدمه دیده در آتل با پوشش نرم فراوان (**soft pad**)
- » بالا قرار دادن اندام
- » اجتناب از سیگار و دود
- » گرم کردن سریع توسط آب با دمای 40-42 درجه سانتیگراد(با کنترل دقیق درجه حرارت آن) معمولاً بین 30-15 دقیقه کافی است .
- » گرم کردن توسط وسایل حرارتی به هر شکل ممنوع است (باعث سوختگی می شود .)
- » ماساژ دادن عضو به هر دلیل ممنوع است (باعث افزایش صدمه می شود)
- » تاول های حاوی مایع روشن باید توسط قیچی دربیدمان شده و مایع داخل آن شستشو داده شود.
- » تاول های حاوی مایع خونی نباید دستکاری شود
- » استفاده از کرم های ضد پروستاگلاندین مثل کرم **Aloe vera** 70% هر 6 ساعت روی محل آسیب دیده
- » استفاده از داروهای ضد پروستاگلاندین مثل ایبوپروفن خوراکی به میزان 5-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن هر 6-8 ساعت
- » استفاده از مسکن های قوی مثل مر فین
- » پروفیلاکسی برای کزار
- » در موارد شدید استفاده از آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک تزریقی مثل سفالوسپورین نسل اول
- » در مواردی که خونرسانی به اندام دچار اشکال است اسکارتوومی و فاشیوتوومی در نظر گرفته شود
- » هیدروترپاپی و فیزیوتراپی داخل آب ولرم از روز دوم به بعد
- » پانسمان به صورت روزانه مکرر

اقدامات درسوختگی با قیر

- » به سرعت سطح قیر را با آب خنک، سرد کنید.
- » برای حل کردن قیر به تدریج می توان از کره، روغن بچه ، پارافین یا **Mineral oil** در طی چند پانسمان (چند روز) استفاده نمود.

اقدامات سوختگی الکتریکی (بابرق و لتاژ بالا):

- » نیاز به مونیتورینگ قلبی مداوم جهت تشخیص آریتمی در 24 ساعت اول دارد
- » حجم ادرار و دفع میوگلوبین باید بادقت تحت نظر باشد
- » آسیبهای الکتریکی دردهان کودکان حتماً بسترهای شوند
- » در صورتیکه پرتاپ شده باشد باید به فکر ضربه سروشکستگی اندامها بود
- » وضعیت خونرسانی انتهای اهوارنگ انگشتان **capillary refill** کنترل شود چون ممکن است نیاز به اسکارتوومی و فاشیوتوومی باشد

ادم و انسداد راه های تنفسی فوقانی :

- علائم : ادم سر و صورت ، استریدور ، دیس پنه ، **horseness** و رتراکسیون سوپرا استرنال زمان شروع علائم از 12 ساعت بعد از حادثه تا حداقل 24-36 ساعت می باشد .
- درمان: هدف از درمان باز نگه داشتن راه هوایی فوقانی است .
- » بالا قرار دادن سر و گردن
 - » اسپیری آدنالین رفیق شده به نسبت یک به چهار در داخل حلق دادن اکسیژن
 - » نبولايزر حاوی آب مقطر و اپی نفرین
 - » در موارد شدید لوله گذاری داخل تراشه پیشرفت سریع استریدور و سایر علائم تنفسی مهمترین اندیکاسیون لوله گذاری داخل تراشه می باشد .

اقدامات تکمیلی در صورت عدم امکان ارجاع فوری :

- برقراری راه وریدی جهت دادن داروی مسکن و سرم
 - گذاشتن لوله معده **NGT** و فیکس کردن آن
 - جهت تسکین درد، آمپول سولفات مورفین با دوز **mg/kg 0/0 5 - 0/1** از راه وریدی و آهسته تزریق گردد . (به صورت تزریق عضلانی و زیر چلی استفاده نمی شود.)
 - سرم رینگر لاکتان به میزان **ml/kg stat 20** دوز است که در شیرخواران کمتر از یک سال طی مدت یک ساعت و در بالای یک سال طی مدت نیم ساعت پر فروزیون می گردد.
 - در صورتیکه مسیر طولانیتر از 2 ساعت است باید یقینه سرم بیمار نیز محسوبه گردید تا بیمار دچار کم آبی نشود
 - چون بیمار **NPO** است باید سرم قندی 5% به عنوان **maintenance deficit** (به شرح زیر) علاوه بر سرم رینگر لاکتان **(100ml/kg)** بیمارداده شود
 - به ازای 10 کیلوگرم اول :
 - 10-20 کیلوگرم : (بیش از 10 کیلوگرم اول **50ml/kg** + به ازای 10 کیلوگرم اول **100ml/kg**)
 - بیش از 20 کیلوگرم : (برای هر کیلوگرم اضافی **ml/kg 20 + برای 10 کیلوگرم دوم 50ml/kg** + به ازای 10 کیلوگرم اول **100ml/kg**)
- ﴿محاسبه **deficit** سوختگی که باید به سرم نگهدارنده اضافه شود . فرمول **Parkland** چهار میلی لیتر سرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ضرب در درصد سوختگی (**ml/kg/TBSA burned 4**) که از مقدار محاسبه شده نصف سرم در 8 ساعت اول و نصف بقیه در 16 ساعت بعد (و یا **1/4** در 8 ساعت دوم و **1/4** در 8 ساعت سوم) داده میشود.﴾

بیگیری

بیگیری کودک دچار سوختگی

بعد از 2 روز

محل سوختگی کودک رانگاه کنید
 اندازه گیری درجه حرارت کودک

درمان :

- ﴿اگر احتمال عفونت سیستمیک مانند حال عمومی بد ، تب و یا هیپوترمی وجود دارد کودک را فوراً به نزدیکترین مرکز درمانی ارجاع دهید.
- ﴿عفونت شدید: اگر تغییررنگ قهوه ای یا سیاه رنگ به صورت نقطه ای در سطح زخم سوخته وجود دارد یا اطراف بوست سوخته تغییررنگ دارد یا ترشح بدبو دارد یا تاخیر در بهبود زخم یا درجه سوختگی بدتر شده است زخم را با سالین گرم تمیز و با بتادین رقیق شده شستشو دهید و با پماد سیلور سولفادیازین روی زخم را پانسمان کنید و به مرکز تخصصی کودک را ارجاع دهید.
- ﴿عفونت خفیف: اگر فقط ترشح زردرنگ در سطح زخم دارد زخم را با سالین گرم تمیز و با بتادین رقیق شده شستشو دهید و با پماد سیلور سولفادیازین روی زخم را پانسمان کنید و توصیه کنید روز بعد جهت بررسی زخم مراجعه کند
- اگر عفونت وجود ندارد به مادر توصیه کنید روز بعد مراجعته نماید.

اگر کودک با شرح حال تماس یابلع فراورده های نفتی مراجعه کرده است :

تشخیص نوع درمان		طبقه بندی	نشهنه ها
» در صورت نیاز، اقدامات احیا (ABC) را مانند جارت مانا انجام دهید..	مسمومیت شدید و حاد نفتنی	سرفه و تنفس مشکل یا نشانه های خطر	• سرفه و تنفس مشکل یا نشانه های خطر •
» تحریک به استفراغ نکنید و شستشوی معده انجام ندهید، زغال فعال ندهید.	مسمومیت حاد نفتنی	خوردن مواد نفتی کمتر از 6 ساعت و نبودن علائم بالا	• خوردن مواد نفتی کمتر از 6 ساعت و نبودن علائم بالا
» تعویض لباس کودک ، شستشوی بدنه و قسمتهای که به فرآورده های نفتی آغشته است.			بویی که احتمال استفاده از مواد نفتی (نفت، بنزین، گازوئیل) را قطعی کند
» به نزدیکترین مرکز مسمومیت (بیمارستان) ارجاع دهید.			

سوال کنید :	مشاهده و استشمام کنید:
• زمان تماس یا بلح ؟	• نشانه های خطر • سرفه و تنفس مشکل

اگر کودک با شرح حال تماس یابلع مواد سوزاننده مراجعه کرده است :

تشخیص نوع درمان		طبقه بندی	نشهنه ها
» در صورت نیاز، اقدامات احیا (ABC) را مانند جارت مانا انجام دهید.	مسمومیت شدید و حاد مواد سوزاننده	مشکل در عمل بلح یا نشانه های خطر یا درگیری چشم ها یادهان	• مشکل در عمل بلح یا نشانه های خطر یا درگیری چشم ها یادهان
» تحریک به استفراغ نکنید و شستشوی معده انجام ندهید، زغال فعال ندهید.	مسمومیت حاد مواد سوزاننده	خوردن مواد سوزاننده کمتر از 6 ساعت و نبودن علائم بالا	• خوردن مواد سوزاننده کمتر از 6 ساعت و نبودن علائم بالا
» محل و اطراف محل تماس پخصوص چشم ها را آب تمیز و فراوان و یا نرمال سالین شستشو دهید			بویی که احتمال استفاده از مواد سوزاننده (پاک کننده ها، سفید کننده هاو غیره) را قطعی کند
» فوری به نزدیکترین مرکز مسمومیت (بیمارستان) ارجاع دهید			

سوال کنید :	مشاهده و استشمام کنید:
• زمان تماس یا بلح ؟	• نشانه های خطر • سوختگی دهان و یا مشکل بلح • بویی که احتمال استفاده از مواد سوزاننده (پاک کننده ها، سفید کننده هاو غیره) را قطعی کند

اگر کودک با شرح حال تماس تنفسی یا پوستی و یا بلع مواد حشره کش و سموم گیاهی (ارگانو فسفره) مراجعه کرده است :

سوال کنید :	مشاهده کنید:
از چه زمانی ؟ چه سمی ؟	نشانه های خطر اندازه مردمک ها نشانه های کولینرژیک *
طبقه بندی کنید	
* نشانه های خطر اندازه مردمک ها نشانه های کولینرژیک *	
<p>در صورت نیاز، اقدامات احیا (ABC) را مانند چارت مانا انجام دهید</p> <p>اگر به پوست و لباس کودک ریخته است، لباس های اورادر آورده و پوست اورابا آب و صابون بشوئید.</p> <p>در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعته زغال فعال (شارکول فعل) 1-2gr/kg بدھید</p> <p>بیمار را وادار به استفراغ نکنید و در صورت امکان شستشوی معده انجام دهید.</p> <p>آتروپین 0.02 mg/kg وریدی در هر دوز تزریق کنید. (آتروپین را با 1-2 ml نرمال سالین رقيق کنید)</p> <p>دوز آتروپین راه راه 5 تا 10 دقیقه تکرار کنید تا ترشحات بروش از بین برود</p> <p>هر 10 دقیقه یک بار، تنفس، نبض و سطح هوشیاری را بررسی و ثبت کنید.</p> <p>در صورتی که کودک تشنج کرده، دیازیام رکتال (چارت مانا) بدھید.</p> <p>فوری به نزدیکترین مرکز مسمومیت ارجاع دهید.</p>	<p>طبقه بندی شدید</p> <p>مسمومیت شدید و حاد با حشره کش</p> <p>نشانه های خطر مردمک تنگ شده ته سنجهاقی یکی از نشانه های کولینرژیک *</p> <ul style="list-style-type: none"> بلع حشره کش یا سموم گیاهی و یکی از علائم زیر: نشانه های خطر مردمک تنگ شده ته سنجهاقی یکی از نشانه های کولینرژیک *
<p>اگر به پوست و لباس کودک ریخته است، لباس های اورادر آورده و پوست اورابا آب و صابون بشوئید.</p> <p>در طی یک ساعت پس از بلع در صورت مراجعته زغال فعال (شارکول فعل) 1-2gr/kg بدھید</p> <p>بیمار را وادار به استفراغ نکنید و در صورت امکان شستشوی معده انجام دهید.</p> <p>کودک را 6 ساعت زیر نظر بگیرید و مراقب بروز نشانه های خطر باشید.</p> <p>به مادر بگویید اگر کودک مشکل پیدا کرد، فوری برگرد.</p> <p>یک روز بعد کودک را برای پیگیری مراجعه کنند</p>	<p>تماس و یا بلع حشره کش یا سموم گیاهی کمتر از 6 ساعت و بدون هیچیکی از نشانه های فوق</p> <p>مسمومیت حاد با حشره کش</p>
<p>اطمینان خاطر دهید.</p> <p>به مادر بگویید اگر کودک مشکل پیدا کرد، فوری برگرد</p> <p>یک روز بعد کودک را پیگیری کنید.</p>	<p>بلع حشره کش یا سموم گیاهی بیشتر از 6 ساعت و عدم وجود علایم بالا</p> <p>مسمومیت حاد بدون علامت</p>

* نشانه های کولینرژیک: آبریزش زیادازدهان ، تعریق ، اسهال ، افزایش ترشحات راه های هوایی ، اشک ریزش و کرامپ عضلانی، نبض ضعیف، مردمک کوچک می باشد.

اگر کوڈک باشرح حال مسمومیت دارویی یا مواد مخدر مراجعہ کرده است :

تشخیص نوع درمان		طبقه بندی	نشانه ها	مشاهده کنید:	سوال کنید :
<p>در صورت نیاز، اقدامات احیا (ABC) رامانندجارت مانا انجام دهد</p> <p>زغال فعال (شارکول فعال) 1-2gr/kg بدهید</p> <p>در صورتی که کودک تایک ساعت پس از بلع مراجعت کرده تحریک به استفراغ *کنید</p> <p>و در صورت امکان شستشوی معده (داروهای با طول عمر طولانی تر بعد از یک ساعت نیز شستشو موثر است) انجام دهد</p> <p>اگر کودک دارای مردمک تنگ، آپنه تنفسی، مشکل تنفسی و یا کاهش سطح هوشیاری بود به مسمومیت با مواد مخدر مشکوک و اقدامات زیر را تا رسیدن به نزدیکترین مرکز مسمومیت انجام دهد:</p> <p>- تزریق نالوکسان بادوز 0.01mg/kg اگر اثرنکردار باشد 0.1mg/kg، و در صورت نیاز ممکن است تکرار شود</p> <p>- در صورت پاسخ به درمان 2 مقدار دوز تجویز شده دارو را در سرم قندی برای یک ساعت تجویز کنید و این عمل را تا 6 ساعت می توانید تکرار کنید</p> <p>فوری به نزدیکترین مرکز مسمومیت ارجاع دهد</p>	مسومیت شدید دارویی	<p>وجود هریک از علائم زیر:</p> <ul style="list-style-type: none"> علایم شوک تنفس مشکل نشانه های خطر استفراغ و مدفوع خونی هیپرترمی یا هیپوترمی علایم کولینزیک و آنتی کولینزیک خورد نامعلوم از هر دارو هر مقدار از مواد مخدر بلغ بیش از : - mg/kg 20 از آهن الممتاز یا 140mg/kg استامینوفن یا 300mg/kg آسیبرین یا 200 mg/kg ایوبروفن یا هارداروی دیگربالاتراز دوز درمانی (اعصاب-آرمبیخش-فشارخون-دیابت) 	نشانه های خطر	<ul style="list-style-type: none"> علایم شوک مانند تعریق ناگهانی یا اندام های سرد تنفس مشکل افزایش درجه حرارت بدن <p>42 درجه سانتیگراد (بالاتر)</p> <ul style="list-style-type: none"> هیپو ترمی علایم کولینزیک و آنتی کولینزیک (اندازه مردمک ها) 	<p>* چه دارویی؟</p> <p>• از چه زمانی؟</p> <p>• چقدر؟</p> <p>• چه علایمی؟ (استفراغ، اسهال، درد شکمی، مدفوع خونی یا ادرار صورتی رنگ....)</p>
<p>زغال فعال (شارکول فعال) 1-2gr/kg بدهید</p> <p>اگر کودک طی یک ساعت پس از بلع آورده شده است، استفراغ * ایجاد کنید و شستشوی معده انجام دهد.</p> <p>کودک را شش ساعت زیر نظر بگیرید و دوباره معاینه کنید.</p> <p>اگر ادرار شفاف است، 12 ساعت بعد کودک را دوباره معاینه کنید.</p> <p>اگر ادرار صورتی رنگ است، فوری ارجاع دهد.</p> <p>در صورت یاقی ماندن نشانه ها، کودک را به بیمارستان ارجاع دهد.</p> <p>به مادر بگویید اگر کودک مشکل پیدا کرد، فوری برگردد</p>	مسومیت متوسط دارویی	<p>نشانه های استفراغ یا اسهال یا درد شکمی و بلع کمتر از:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20mg/kg از آهن الممتاز یا 140mg/kg استامینوفن یا 200 mg/kg ایوبروفن یا 150-300mg/kg آسپیرین 	<p>* اگر کودک هوشیار باشد با تحریک عقب حلق به وسیله آبسلانگ یا با دسته یک قاشق وی را تحریک به استفراغ کنید. اگر استفراغ نکرد، یک داروی تحریک کننده استفراغ مانند شربت اپیکا (زیر 6 ماه استفاده از شربت اپیکا منوع است) بدهید.</p> <p>شربت اپیکا ml 10 برای 6 ماه تا 2 سال یا ml 15 برای بالای 2 سال داده می شود</p>		
<p>در صورتی که کودک تایک ساعت پس از بلع مراجعت کرده تحریک به استفراغ *کنید</p> <p>و در صورت امکان شستشوی معده انجام دهد</p> <p>دو از ده ساعت بعد کودک را دوباره معاینه نمایید.</p> <p>به مادر بگویید اگر کودک مشکل پیدا کرد، فوری برگردد</p>	مسومیت خفیف دارویی	<p>بلع کمتر از:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20mg/kg از آهن الممتاز یا 140mg/kg استامینوفن یا 150mg/kg آسیبرین یا 200 mg/kg ایوبروفن <p>عدم وجود هیچیک از نشانه های فوق</p>			

اگر کودک با شرح حال مار گزیدگی مراجعه کرده است :

سوال کنید :	مشاهده کنید:	
طبقه بندی کنید		
تشخیص نوع درمان <ul style="list-style-type: none"> » زخم را تمیز کنید » روی محل گزیدگی را برش ندهید و با دهان زهر را مکش نکنید. » از کمپرس یخ به هیچ عنوان استفاده نکنید » اندام آسیب دیده (دست یا پا) را با آتلی بی حرکت نگهادارید و در سطح پایین تراز قاب نگه دارید » در صورت وجود علائم نورو توکسیک ، از محل انگشتان تا قسمت پروگریمال محل گرش بانداز کنید. » از توونیکه استفاده نکنید. » فوری به نزدیکترین بیمارستان ارجاع دهید 	طبقه بندی مار گزیدگی با مسمومیت <ul style="list-style-type: none"> • شرح حال مار گزیدگی و یکی از علائم زیر: • نشانه های خطر • تمایل به خونریزی ** • درد موضعی شدید و یاتورم • مشکل دریغ یاد رتفنس • آمون لخته مثبت* • گزیدگی ناحیه سر، گردن و تنفس • نکروز موضعی • ادرار قهقهه ای تیره • افتادگی پلک و فلنج عضلات 	نشانه ها <ul style="list-style-type: none"> • شرح حال مار گزیدگی بیشتر از 6 ساعت و عدم وجود هیچیک از علائم بالا
از 8 تا 12 ساعت کودک مسمومیت باز هر دارد (تائیرزه) و نیازمند ارجاع فوری است. <p>به مادر آرامش خاطر دهد و بگویید اگر کودک مشکلی پیدا کرد ، فوری برگردد</p>	طبقه بندی مار گزیدگی بدون مسمومیت	مشاهده کنید: <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • درد موضعی یا تورم • نکروز موضعی • ادرار قهقهه ای تیره تا سیاه رنگ • مشکل دریغ یاد رتفنس • مشکل تنفسی • افتادگی پلک و فلنج عضلات • خونریزی خارجی از لته ها ، زخم ها و علائم خونریزی داخل جمجمه • آزمون لخته مثبت

* آزمون لخته 10 دقیقه ای باریختن 2 سی سی خون به داخل لوله آزمایشی که حاوی مواد ضد انعقاد نیست و مشاهده لخته پیش از 10 دقیقه کناری قرار گیرد. اگر در طی این مدت لخته ای تشکیل نشد، کودک مسمومیت باز هر دارد (تائیرزه) و نیازمند ارجاع فوری است.

** پیشی ، خونریزی ازینی ، خونریزی از دستگاه گوارش ، ادرار خونی ، خلط خونی (خون روشن با سرفه یا کف آلد ازدهان)

اگر کودک با شرح حال گزش حشرات، عقرب یا رطیل مراجعه کرده است :

مشاهده کنید:

- نشانه های خطر
- علائم شوک مانند تعربیق ناگهانی یا اندام های سرد
- تنفس مشکل یا استریدور
- اختلال دید
- درد عضلانی متناوب
- محل گزیدگی یا وجود نیش

تشخیص نوع درمان	طبقه بندی	نشانه ها
<p>» از کمپرس آب سرد یا یخ برای کاهش درد و تورم موضعی استفاده کنید.</p> <p>» زخم را تمیز کنید</p> <p>» روی محل گزیدگی رابرش ندهید و بادهان زهر رامکش نکنید و از تورنیکه استفاده نکنید</p> <p>» به دنبال شوک آنافیلاکسی یا علائم آنافیلاکسی قریب الوقوع (مانند خارش عمومی، خشونت صدا، تورم زبان کوچک) بگردید و اقدامات زیر رابه سرعت انجام دهید:</p> <p>1- آدرنالین 1ml (1:1000) عضلانی / وریدی</p> <p>2- آمپول کلرفیرامین مالاث 1-2 mg عضلانی / وریدی</p> <p>3- میدروکورتیزون 50-100mg عضلانی / وریدی</p> <p>4- نبولا یزر سالبوتامول یا اسپری آن در صورت وجود اسپاسم برونش فوری به بیمارستان ارجاع دهید.</p>	گزش شدید	<ul style="list-style-type: none"> • شرح حال گزش و یکی از علائم زیر: • نشانه های خطر یا علائم شوک یا • تنفس مشکل یا استریدور یا اختلال دید یا • درد عضلانی متناوب
<p>» زخم را تمیز کنید.</p> <p>» وضعیت واکسیناسیون کراز رابریسی کنید.</p> <p>» شربت دیفن هیدرامین تجویز کنید.</p> <p>» در صورت نیاز، استامینوفن بدھید.</p> <p>» کودک را به مدت 6 ساعت زیر نظر بگیرید. اگر علائم پیدا کرد فوری ارجاع دهید.</p> <p>» به مادر آرامش خاطر دهد و بگویید اگر کودک مشکلی پیدا کرد، فوری برگرد</p>	گزش غیر شدید	<ul style="list-style-type: none"> • واکنش (تحریک) موضعی

اگر کودک با شرح حال گازگرفتگی مراجعه کرده است :

سوال کنید :

سوال کنید :	مشاهده کنید :
<p>آیا کودک توسط حیواناتی نظیر گریه، سگ یا حیوان مشکوک به هاری (شغال، خفاش....) گردید یا لیسیده شده است؟</p> <p>یانور، افزایش ترشح براق</p> <p>فلج شل پایین رونده</p>	<ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تب، ضعف، بی اشتہانی • ظهور ناگهانی علائم عصبی مانند تحریک پذیری، ترس از آب

توصیه ها	طبقه بندی	نشانه
<p>» اقدامات محتمل به هاری رالنجام دهید</p> <p>» به نزدیکترین بیمارستان فوری ارجاع دهید</p> <p>» حیوان مهاجم تحت نظر قرار گیرد و گزارش فوری به مرکز بهداشت شهرستان داده شود</p>	مقطون به هاری	<ul style="list-style-type: none"> • شرح حال گازگرفتگی و یکی از علائم زیر: • نشانه های خطر • تب، ضعف، بی اشتہانی • ظهور ناگهانی علائم عصبی • فلچ شل پایین رونده
<p>» با آب تمیز و صابون لا بلای زخم را حداقل بمدت 10 دقیقه شستشو دهید</p> <p>» کف صابون را با استفاده از فشار آب از لا بلای زخم شسته شود</p> <p>» قسمت های له شده و کثیف از زخم جدا شود</p> <p>» با محلول بتادین یا الکل اتیلیک (70-40٪) زخم را ضد عفونی کنید</p> <p>» زخم حیوان گزیده را نباید بخیه زد</p> <p>» کودک را فورا به مرکز بهداشت شهرستان برای اقدامات تکمیلی (واکسن) ارجاع دهید</p> <p>» حیوان مهاجم تحت نظر قرار گیرد و گزارش به مرکز بهداشت شهرستان داده شود</p>	محمل به هاری	<ul style="list-style-type: none"> • سابقه گازگرفتگی و عدم وجود هیچیکی از علائم بالا

