

شماره: ۶۶۵/۲۸۸۱۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
پیوست: ندارد



معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: رقیق سازی داروی رمدسیویر

با سلام و احترام؛

به استحضار می رساند، رقیق سازی هر ۱۰۰ میلی گرم داروی رمدسیویر به فرم پودر لئوفیلیره می بایست حداقل در ۱۰۰ سی سی نرمال سالین و فرم مایع آن حداقل در ۲۵۰ سی سی نرمال سالین صورت گیرد. ضمناً در صورت ضرورت تجویز حداکثر ۱۰۰ سی سی محلول تزریقی وریدی، توصیه می گردد جهت رقیق سازی فرم های مایع رمدسیویر حتماً از محلول هاف سالین استفاده شود. همانگونه که قبلاً هم عنوان شده بود، رمدسیویر در محلول های حجیم تزریقی وریدی حاوی سدیم کلراید و دکستروز پایدار می باشد.

دکتر سید حیدر محمدی
مدیر کل امور کلر و مواد تحت کنترل

رونوشت :

جناب آقای دکتر مساعد رونکیانی رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبتهای دارویی

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸ نمابر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir