



مکتبه علمی زنگنه
کانون پرورش فکری
کانون پرورش فکری

پیشگیری از پاره فشار خون



مرکز بهداشت استان هرگز روی

- سبک زندگی خود را تغییر دهید،
بدین منظور روزانه ۳۰ دقیقه پیاده روی
سریع داشته باشید، وزن خود را
کنترل کنید و به وزن متناسب با قد
خود برسید، الکل مصرف نکنید،
سیگار کشیدن را ترک کنید و
استرس عاطفی و فیزیکی خود را از
طريق مثبت فکر کردن و دادن آرامش
به خود به حداقل برسانید.

- از یک الگوی غذایی سالم بپروری
کنید. این الگوی سالم دارای مقادیر
کم چربی اشبع. کلسترول و نمک
می باشد.

از گوشت های بدون چربی، ماهی
(مثل قزل آلا) و پرنده کان، لبنتی کم
چرب و روغن مایع (خصوصاً روغن
کاتولا، سویا و زیتون) استفاده کنید.
به میزان بیشتری از میوه ها،
سبزیجات، دانه ها، جبویات، مغزها و
غلات کامل مصرف کنید.
از لبنتی کم چرب استفاده کنید.

منابع:

- ۱- مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیرواکسر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (امتحنای آموزش پزشک و بهورز)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۹۶.
- ۲- توصیه هایی برای پیشگیری و کنترل فشارخون، تالیف مرکز بهداشت استان عوکزی، ۱۳۹۴.
- ۳- Guideline for the diagnosis and management of hypertension in adults, national heart foundation of Australia, 2016.

نکته ۲
افراد سالم می توانند **حداکثر ۵ گرم نمک** (یا
یک قاشق مربا خوری سر صاف) در
شبانه روز مصرف کنند که نیمی از آن از
مواد غذایی مختلف به دست می آید
و نیم دیگر حاصل نمک افزوده به
غذا می باشد.

افراد مبتلا به فشارخون بالا باید
حداکثر ۳ گرم نمک (یک قاشق چایخوری
سر صاف) مصرف کنند که نیمی از آن از
مواد غذایی مختلف و نیم دیگر حاصل
نمک افزوده به غذا باشد.

البته لازم است قبل از تغییر در میزان
نمک مصرفی و همچنین قبل از شروع
یک فعالیت ورزشی به پزشک مراجعه
گردد.

در افرادی که فشارخون بالا دارند ورزش
های سنگین همانند وزنه برداری و بدنه
سازی منوع است.

اگر هر نوع فعالیت فیزیکی و ورزشی
باعث درد در قسمتی از بدن و یا به
طور کلی ایجاد حس ناخوشایند شود
باید فوراً متوقف شده و با پزشک
مشاورت گردد.

نکات کنترل فشارخون

- در دوره های زمانی مشخص با مراجعه
به مرکز، پایگاه های سلامت،
خانه های بهداشت و مطب پزشکان
فشارخون خود را بررسی کنید.

به منظور اجتناب از افزودن نمک
به غذای روزانه می توانیم
راهکارهای زیر را انجام دهیم:

- در هنگام پخت و پز، نمک را در
پایان پخت و به میزان کم به غذا
اضافه کنیم.

- از مصرف غذاهای کارخانه ای
همانند چیپس سیب زمینی،
سوسیس، غذاهای کنسرو شده و
بسته بندی شده خودداری کنیم.

- از غذاهایی که دارای میزان کمتری
نمک هستند استفاده کنیم.

حقایق


فشارخون بالا علت اصلی بیماری و
مرگ ناشی از بیماری های قلبی
عروقی است که کاملاً قابل
پیشگیری است. میزان شیوع فشار
خون بالا در افراد بالای ۱۸
سال استان برابر با $29/9$ درصد می
باشد که ۳ درصد بیشتر از میانگین
کشوری است.

نکته ۱

اگر فشارخون بالا با تغییر سبک
زندگی و تغذیه کاهش نیافت ممکن
است به دارو نیز نیاز باشد. در این
خصوصی تعداد زیادی داروی
فشارخون وجود دارد که بعضی از
آنها باید در طولانی مدت مصرف
شوند.

فشار خون چیست؟

فشار خون نیرویی است که خون به دیواره های عروق خونی وارد می کند که از این طریق خون غنی از اکسیژن از قلب به تمامی اندام های بدن منتقل می شود. قلب با منقبض شدن خون را به بدن رسانده و بین هر دو ضربه قلبی استراحت می کند. بنابراین وقتی فردی فشار خون شما را اندازه می گیرد ۲ اندازه به دست می آید (به طور مثال ۱۲۰ برس روی ۸۰ میلیمتر جیوه و یا $\frac{120}{80}$ mmHg).



فشارخون سیستولیک: فشارخون موجود در سرخرگ هازمانی که قلب منقبض می شود که معادل با عدد بالای کسر می باشد. (به طور مثال 120°).

فشارخون دیاستولیک: میزان فشارخون موجود در سرخرگ هازمانی که قلب می باشد با عدد بالای کسر است که معادل با عدد پایین کسر می باشد. (به طور مثال 80°).

فشارخون بالازمانی رخ می دهد که خون یا نیرویی بیشتر از حد معمول به داخل شریان ها یمپ می شود.

فشارخون وسلامتی

کاهش فشارخون بالا از طریق اصلاح سبک زندگی و عادات مصرف مواد غذایی، خطر بیماری های قلبی عروقی از جمله حمله قلبی کشنده و یا سکته مغزی را کاهش می دهد. کاهش فشارخون برای بیشگیری از بیماری هاو عوارض زیر مفید است:

- بیماری عروق قلبی
- حمله قلبی
- سکته مغزی
- بیماری عروق محیطی
- بیماری های کلیه
- مشکلات بینایی و کوری

فشارخون بالا و نمک

مصرف زیاد تمک خطیر فشارخون بالا را افزایش می دهد زیرا سدیم موجود در تمک موجب می شود که بدن آب بیشتری را نگه دارد که این خود فشار بیشتری را بجای می کند درنتیجه قلب مجبور می شود که شدیدتر کار کند تا خون را به قسمت های مختلف بدن برساند. کلیه های ماسدیم اضافی را از بدن دفع می کند و به این طریق فشارخون را در حد طبیعی حفظ می کند. دریافت سدیم بیش از حد از طریق نمک می تواند کلیه هارا تحریب کرده و به این طریق توانایی کلیه در برداشت سدیم اضافی خون کاهش می یابد.



- سیگار کشیدن و استعمال سایر مواد دخانی و مصرف الکل
- کلسترول خون بالا
- داشتن اضافه وزن
- بی تحرکی جسمانی
- مصرف زیاد نمک
- دیابت
- تاریخچه خانوادگی فشارخون بالا

چند وقت یکبار فشارخون خود را اندازه بگیرید؟

- افرادی که فشارخون طبیعی دارند (کمتر از $120/80$ میلی متر جیوه) لازم است حداقل هر دو سال یکبار فشارخون خود را اندازه بگیری کنند.

- افرادی که مبتلا به پیش فشارخون بالا هستند لازم است در طول حداقل ۴ الی عهده بعد چند بار فشارخون خود را اندازه بگیری کنند تا میانگین این فشارخون های اندازه بگیری شده به دست آید.

در صورت فشارخون بالای مرحله ۱ و ۲ که فشارخون سیستولیک 140 میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون دیاستولیک 90 میلی متر جیوه و بیشتر باشد باید به پزشک مراجعه کنند.



فشارخون بالا معمولاً علامت هشدار دهنده ای ندارد، یعنی ممکن است در حالیکه احساس بیماری نمی کنید هم‌مان دارای فشارخون بالا نیز باشد.

اندازه گیری و نحوه تفسیر میزان فشارخون

در صورتی که سن بالای 30 سال دارید لازم است در فواصل زمانی منظم فشارخون خود را اندازه بگیرید و میزان خطرات بیماری های قلبی عروقی خود را برسی نمایید. این اقدامات با مراجعته به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه ها و خانه های بهداشت در محل سکونت شما امکان پذیر می باشد. میزان مطلوب یا ایده آلتی برای فشارخون وجود ندارد اما با این وجود یعنی از اینکه فشارخون خود را در هر یک از مراکز ذکر شده اندازه گرفتید از مقادیر زیر می توانید به عنوان راهنمایی تفسیر آن استفاده کنید.

فشارخون سیستولیک	فشارخون دیاستولیک	طبقه بندی فشارخون
کمتر از 80	کمتر از 60	طبیعی یا مطلوب
$80-89$	$60-79$	پیش فشارخون بالا
$90-99$	$70-79$	فشارخون بالای مرحله ۱
$100-109$	$80-89$	فشارخون بالای مرحله ۲
$110-129$	$90-99$	
$130-139$	$100-109$	
$140-159$	$110-119$	
$160-179$	$120-129$	
$180-199$	$130-139$	
$200-$	$140-$	

عوامل ایجاد کننده فشارخون کدامند؟

علت خاصی برای ایجاد فشارخون بالا در اکثر افراد مشاهده نشده است اما موارد ذکر شده احتمال ایجاد فشارخون را در افراد تشخیص دید می کند:

