

ASQ-3

✓ تست غربالگری تکامل ASQ-3 برای کدام کودکان انجام شود؟

- این پرسشنامه‌ها به صورت روتین برای کودکان در سنین 6، 12، 24، 36 و 60 ماهگی تکمیل می‌شود.
- برای کلیه کودکانی که در مراقبت‌های دوره ای کودک سالم طبق ارزیابی تکامل بوکلت Red Flag در "2، 9، 18 و 48 ماهگی در طبقه‌بندی نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل قرار می‌گیرند، پرسشنامه مرتبط با سن کودک تکمیل گردد.
- برای کودکان در سن 2 ماهگی، در صورتی که وزن تولد " کمتر از 2500 گرم " یا " سن بارداری کمتر از 37 هفته " یا " به هر دلیلی سابقه بستری در بیمارستان (NICU) " را دارند همچنین جهت این کودکان پرسشنامه ASQ تا زمان کسب امتیاز لازم در سایر سنین نیز باید تکمیل گردد.

✓ گروه‌های سنی و پوشش پرسشنامه‌های ASQ :

1	2 ماهگی	1 ماه و 0 روز تا 2 ماه و 30 روز	12	22 ماهگی	21 ماه و 0 روز تا 22 ماه و 30 روز
2	4 ماهگی	3 ماه و 0 روز تا 4 ماه و 30 روز	13	24 ماهگی	23 ماه و 0 روز تا 25 ماه و 15 روز
3	6 ماهگی	5 ماه و 0 روز تا 6 ماه و 30 روز	14	27 ماهگی	25 ماه و 16 روز تا 28 ماه و 15 روز
4	8 ماهگی	7 ماه و 0 روز تا 8 ماه و 30 روز	15	30 ماهگی	28 ماه و 16 روز تا 31 ماه و 15 روز
5	9 ماهگی	9 ماه و 0 روز تا 9 ماه و 30 روز	16	33 ماهگی	31 ماه و 16 روز تا 34 ماه و 15 روز
6	10 ماهگی	10 ماه و 0 روز تا 10 ماه و 30 روز	17	36 ماهگی	34 ماه و 16 روز تا 38 ماه و 30 روز
7	12 ماهگی	11 ماه و 0 روز تا 12 ماه و 30 روز	18	42 ماهگی	39 ماه و 0 روز تا 44 ماه و 30 روز
8	14 ماهگی	13 ماه و 0 روز تا 14 ماه و 30 روز	19	48 ماهگی	45 ماه و 0 روز تا 50 ماه و 30 روز
9	16 ماهگی	15 ماه و 0 روز تا 16 ماه و 30 روز	20	54 ماهگی	51 ماه و 0 روز تا 56 ماه و 30 روز
10	18 ماهگی	17 ماه و 0 روز تا 18 ماه و 30 روز	21	60 ماهگی	60 ماه و 0 روز تا 66 ماه و 30 روز
11	20 ماهگی	19 ماه و 0 روز تا 20 ماه و 30 روز			

✓ تطبیق دادن سن برای کودکانی که نارس بدنیا آمده اند:

اگر کودک بیشتر از 3 هفته قبل از تاریخ تعیین شده برای زایمان (40 هفتگی) به دنیا آمده باشد (یعنی کمتر از 37 هفته) و سن تقویمی او کمتر از 2 سال باشد، باید سن تطبیق یافته برای نارسى جهت کودک محاسبه شود.

برای این منظور از این روش استفاده کنید: با تفریق تعداد هفته‌های نارسى (فاصله سن حاملگی از 40 هفته) از سن تقویمی کودک، سنی که حاصل می‌شود " سن اصلاح شده " است و مبنای تعیین پرسشنامه از گروه سنی مناسب خواهد بود.

مثال: اگر کودکی با سن بارداری 28 هفته به دنیا آمده باشد (12 هفته = 28-40) این کودک 12 هفته یا 3 ماه زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده است بنابراین در 12 ماهگی باید پرسشنامه 9 ماهگی برای این کودک تکمیل شود.

✓ نحوه امتیازدهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده ASQ-3:

1. پس از این که والدین به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند :
2. ابتدا پرسشنامه را از نظر یافتن سوالات بی پاسخ، مرور کنید و اگر همه سوالات پاسخ داده شده بودند، اقدامات بعدی را انجام دهید.
3. اگر سوالاتی بی پاسخ مانده بودند، سعی کنید که دلیل آن را بفهمید؛ در چنین مواردی معمولاً والدین به پاسخ صحیح اطمینان ندارند یا در مورد اینکه کودک آن‌ها فعالیت مورد نظر را به درستی انجام می‌دهد یا نه، نگرانی و شک دارند. سعی کنید اطلاعات لازم را از والدین جمع آوری کرده و به سوالات بی‌پاسخ، پاسخ داده و امتیاز دهید. در صورتی که به هر دلیل نتوانستید پاسخ سوال را دریافت کنید به صورت زیر عمل کنید:
الف) اگر تنها یک سوال در یک حیطه تکاملی بی پاسخ مانده بود، جمع امتیازات سوالاتی که در آن حیطه تکاملی پاسخ داده شده‌اند را محاسبه کرده و سپس بر تعداد سوالات پاسخ داده شده در آن حیطه تقسیم کنید. به این ترتیب، میانگین امتیاز سوالات دارای پاسخ در آن حیطه تکاملی تعیین می‌شود. آن گاه این رقم میانگین را به جمع امتیازات سوالاتی که در آن حیطه تکاملی پاسخ داده شده‌اند، اضافه کنید. عدد حاصله «امتیاز تطبیق یافته» است. سپس امتیاز تطبیق یافته را مانند موارد دیگر با " نقطه برش " آن حیطه تکاملی مقایسه و اقدامات بعدی را انجام دهید.
مثال : اگر مادر به 5 سوال از 6 سوال حیطه تکاملی حرکات درشت در پرسشنامه 4 ماهگی پاسخ داده باشد، که از آن میان 3 سوال پاسخ « بلی » (مجموعاً معادل 30 امتیاز)، 1 سوال پاسخ « گاهی » (5 امتیاز) و یک سوال پاسخ « هور نه » (0 امتیاز) داشته باشد نحوه محاسبه به شرح زیر است:
جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک آنها 35 امتیاز خواهد بود، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ داده شده (5 سوال) تقسیم گردد (35 تقسیم بر 5 مساوی 7) ، رقم 7 بدست می‌آید. این رقم 7 را با جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت کودک (35) جمع می‌کنیم (35+7 مساوی 42) عدد 42 امتیاز تطبیق یافته یا همان امتیاز نهایی کودک از حیطه تکاملی حرکات درشت است.
ب) اگر دو سوال در یک حیطه تکاملی بی پاسخ مانده بود، میانگین امتیاز سوالات دارای پاسخ در آن حیطه تکاملی را ابتدا ضرب در عدد 2 کنید و رقم به دست آمده را به جمع امتیازات سوالاتی که در آن حیطه تکاملی پاسخ داده شده‌اند، اضافه کنید تا امتیاز تطبیق یافته به دست آید. در واقع به این ترتیب عدد میانگین را برای هر یک از سوالات پاسخ داده نشده منظور می‌کنیم.
مثال : اگر مادر تنها به 4 سوال از 6 سوال حیطه تکاملی حرکات درشت در پرسشنامه 4 ماهگی پاسخ داده باشد، که از آن میان 2 سوال پاسخ « بلی » (مجموعاً معادل 20 امتیاز)، 1 سوال پاسخ « گاهی » (5 امتیاز) و یک سوال پاسخ « هور نه » (0 امتیاز) داشته باشد، نحوه محاسبه به شرح زیر است:
جمع امتیازات حیطه تکاملی حرکات درشت این کودک 25 امتیاز خواهد بود، که وقتی بر تعداد سوالات پاسخ داده شده (4 سوال) تقسیم گردد (25 تقسیم بر 4 مساوی 6.25) ، عدد 6.25 بدست می‌آید. عدد 6.25 را ضرب در دو کنید (6.25 ضربدر 2 مساوی 12.5) ، عدد 12.5 بدست می‌آید. عدد 12.5 را با امتیازات حیطه تکاملی مورد نظر (25) جمع کنید (12.5 به اضافه 25 مساوی 37.5) ، امتیاز تطبیق یافته یا امتیاز نهایی کودک مورد نظر 37.50 خواهد بود.
ج) اگر سه سوال یا بیشتر در یک حیطه تکاملی بی پاسخ مانده بود، امتیاز آن حیطه تکاملی قابل محاسبه نیست.

✓ نقاط برش ASQ-3 و ملاک های ارجاع:

1. کودکی که امتیاز حیطه‌های تکاملی در پرسشنامه بالاتر از **منطقه پایش** است، **نرمال** می‌باشد، به والدین فعالیت‌ها و تمرینات تکاملی مناسب با سن کودک معرفی و ارائه شود.
2. کودکی که امتیاز در **یک یا چند حیطه تکاملی** در «منطقه پایش» قرار می‌گیرد اقدامات پیگیرانه انجام شود. یعنی به والدین فعالیت‌ها و تمرینات تکاملی متناسب با گروه سنی کودک و نیز متناسب با حیطه تکاملی که در آن کودک **ضعیف** بوده است را آموزش داده تا اجرا نمایند، سپس **2 هفته بعد** مراجعه نماید تا از نحوه درست به کار بردن این آموزش‌ها با کودک مطمئن شویم و مجدداً پرسشنامه همان سن مراجعه اول کودک، برایش تکمیل شود.
3. کودکی که امتیاز در پرسشنامه، نیاز به ارجاع به پزشک معین تکامل (به منظور انجام ارزیابی‌های تشخیصی و تکمیلی) دارد، شامل این کودکانی هستند که امتیاز در یکی از حیطه‌های تکاملی **پایین‌تر از نقطه برش** مربوط به گروه سنی خودش (یعنی پایین‌تر از -2SD) باشد و یا کودکی که امتیاز او در مراجعه اول در منطقه پایش بوده و بعد از انجام

تمرینات تکاملی (بعد از 2 هفته) مجدداً تست برای کودک انجام شده و **همچنان در منطقه پایش** قرار داشته باشند یا **پایین‌تر از نقطه برش** باشد. چنانچه امتیازات یک کودک در کلیه حیطه های تکاملی بالاتر از نقطه برش قرار دارد، ولی والدین او در بخش «کلیات» پرسشنامه نگرانی خود را در خصوص یک یا چند سوال ابراز کرده‌اند، کودک را باید برای ارزیابی‌های بیشتر و تکمیلی ارجاع نمود.

✓ **نکته:**

پس از محاسبه امتیاز کودک از پرسشنامه تکمیل شده، اگر امتیاز کودک در " منطقه پایش " یا " نیاز به ارجاع " داشته باشد، این نتایج را محتاطانه، همدلانه، حمایت‌گر و غیر تهدیدآمیز با والدین درمیان بگذارید، تا هم بیش از اندازه نگران و مضطرب نشوند و هم اینکه پیگیری ارجاع کودک را جدی بگیرند

نقاط برش ASQ ورژن 3										
ارجاع (کمتر از)	منطقه پایش	طبیعی	حیطه	سن (ماه)		ارجاع (کمتر از)	منطقه پایش	طبیعی	حیطه	سن (ماه)
		(بیشتر از)						(بیشتر از)		
33.7	33.7-44.7	44.7	برقراری ارتباط	12 ماهگی		28	28-39.4	39.4	برقراری ارتباط	2 ماهگی
27.5	27.5-39.2	39.2	حرکات درشت			32	32-42.2	42.2	حرکات درشت	
37.5	37.5-46.1	46.1	حرکات ظریف			32.4	32.4-41.7	41.7	حرکات ظریف	
36.4	36.4-45.3	45.3	حل مسأله			20.9	20.9-34.1	34.1	حل مسأله	
29.6	29.6-40.4	40.4	شخصی- اجتماعی			28.3	28.3-38.8	38.8	شخصی- اجتماعی	
32.2	32.2-42.1	42.1	برقراری ارتباط	14 ماهگی		38.7	38.7-46	46	برقراری ارتباط	4 ماهگی
38.6	38.6-47.4	47.4	حرکات درشت			30.9	30.9-41.7	41.7	حرکات درشت	
32.3	32.3-42.2	42.2	حرکات ظریف			24.1	24.1-36.9	36.9	حرکات ظریف	
41.2	41.2-48.2	48.2	حل مسأله			36	36-45.1	45.1	حل مسأله	
38.4	38.4-46.6	46.6	شخصی- اجتماعی			35	35-44.2	44.2	شخصی- اجتماعی	
27.2	27.2-38.5	38.5	برقراری ارتباط	16 ماهگی		33	33-41.8	41.8	برقراری ارتباط	6 ماهگی
40.3	40.3-48.6	48.6	حرکات درشت			22	22-34.2	34.2	حرکات درشت	
34.5	34.5-44.1	44.1	حرکات ظریف			35.8	35.8-45.2	45.2	حرکات ظریف	
39.5	39.5-47.5	47.5	حل مسأله			33.8	33.8-43.3	43.3	حل مسأله	
35.3	35.3-44.2	44.2	شخصی- اجتماعی			28.5	28.5-39.4	39.4	شخصی- اجتماعی	
29.5	29.5-39.8	39.8	برقراری ارتباط	18 ماهگی		38	38-46	46	برقراری ارتباط	8 ماهگی
47	47-52.6	52.6	حرکات درشت			28.3	28.3-39.8	39.8	حرکات درشت	
34.4	34.4-43.5	43.5	حرکات ظریف			41.9	41.9-49.7	49.7	حرکات ظریف	
34.4	34.4-43	43	حل مسأله			39.7	39.7-47.5	47.5	حل مسأله	
41.7	41.7-48.1	48.1	شخصی- اجتماعی			39	39-46.9	46.9	شخصی- اجتماعی	
30	30-41	41	برقراری ارتباط	20 ماهگی		32.3	32.3-42.1	42.1	برقراری ارتباط	9 ماهگی
42	42-49.6	49.6	حرکات درشت			21.3	21.3-34.8	34.8	حرکات درشت	
34.7	34.7-43.8	43.8	حرکات ظریف			43.1	43.1-49.9	49.9	حرکات ظریف	
33.8	33.8-42.7	42.7	حل مسأله			36.8	36.8-45.4	45.4	حل مسأله	
37.6	37.6-45.7	45.7	شخصی- اجتماعی			27	27-38.4	38.4	شخصی- اجتماعی	

نقاط برش ASQ ورژن 3

ارجاع (کمتر از)	منطقه پایش	طبیعی	حیطه	سن (ماه)		ارجاع (کمتر از)	منطقه پایش	طبیعی	حیطه	سن (ماه)
		(بیشتر از)						(بیشتر از)		
27	27-39.2	39.2	برقراری ارتباط	22 ماهگی		37.1	37.1-45.5	45.5	برقراری ارتباط	10 ماهگی
40.2	40.2-47.2	47.2	حرکات درشت			29	29-40.6	40.6	حرکات درشت	
29.2	29.2-39	39	حرکات ظریف			44.8	44.8-51.1	51.1	حرکات ظریف	
35.8	35.8-44	44	حل مسأله			39.9	39.9-47.4	47.4	حل مسأله	
37	37-45.4	45.4	شخصی- اجتماعی			32.8	32.8-42.2	42.2	شخصی- اجتماعی	
33.2	33.2-43.4	43.4	برقراری ارتباط	27 ماهگی		38.4	38.4-47	47	برقراری ارتباط	24 ماهگی
32.8	32.8-42.9	42.9	حرکات درشت			41.6	41.6-48.6	48.6	حرکات درشت	
26.5	26.5-37.9	37.9	حرکات ظریف			30.9	30.9-40.7	40.7	حرکات ظریف	
39.7	39.7-47.6	47.6	حل مسأله			34.1	34.1-43.2	43.2	حل مسأله	
30.5	30.5-40.6	40.6	شخصی- اجتماعی			36.2	36.2-44.8	44.8	شخصی- اجتماعی	
36.7	36.7-45.8	45.8	برقراری ارتباط	33 ماهگی		38	38-46.3	46.3	برقراری ارتباط	30 ماهگی
37.1	37.1-46.4	46.4	حرکات درشت			38.2	38.2-46.8	46.8	حرکات درشت	
25.5	25.5-37.6	37.6	حرکات ظریف			25.6	25.6-37.2	37.2	حرکات ظریف	
37.4	37.4-46.5	46.5	حل مسأله			40.4	40.4-48	48	حل مسأله	
30.9	30.9-41.5	41.5	شخصی- اجتماعی			36.3	36.3-44.7	44.7	شخصی- اجتماعی	
43.9	43.9-50.4	50.4	برقراری ارتباط	42 ماهگی		41	41-48.3	48.3	برقراری ارتباط	36 ماهگی
40.4	40.4-48.3	48.3	حرکات درشت			36.5	36.5-45.8	45.8	حرکات درشت	
31.1	31.1-41.2	41.2	حرکات ظریف			29	29-40.2	40.2	حرکات ظریف	
40.7	40.7-48	48	حل مسأله			42	42-48.9	48.9	حل مسأله	
36.2	36.2-44.8	44.8	شخصی- اجتماعی			33.1	33.1-42.4	42.4	شخصی- اجتماعی	
47.3	47.3-52.6	52.6	برقراری ارتباط	54 ماهگی		40.5	40.5-48.4	48.4	برقراری ارتباط	48 ماهگی
40.6	40.6-48.2	48.2	حرکات درشت			37.9	37.9-46.3	46.3	حرکات درشت	
26.8	26.8-38.4	38.4	حرکات ظریف			23.5	23.5-36	36	حرکات ظریف	
28.1	28.1-37.8	37.8	حل مسأله			35.7	35.7-44.4	44.4	حل مسأله	
40.5	40.5-48.2	48.2	شخصی- اجتماعی			39.6	39.6-46.9	46.9	شخصی- اجتماعی	
						41.6	41.6-48.9	48.9	برقراری ارتباط	60 ماهگی
						37.6	37.6-46.5	46.5	حرکات درشت	
						20.5	20.5-33.7	33.7	حرکات ظریف	
						26	26-36.5	36.5	حل مسأله	
						40.3	40.3-48	48	شخصی- اجتماعی	

ASQ-SE

✓ تست غربالگری تکامل ASQ-SE برای کدام کودکان انجام شود؟

1. این پرسشنامه جهت کلیه کودکانی که با پرسشنامه ASQ3 در هر گروه سنی شامل ارجاع هستند، می‌شود
 2. برای کودکان در سن 2 ماهگی، در صورتی که وزن تولد " 2000 کیلوگرم یا کمتر " یا " سن بارداری کمتر از 34 هفته " یا به هر دلیلی سابقه‌ی " دریافت اکسیژن " در زمان تولد در بیمارستان را دارند.
- پرسشنامه مربوطه در پایگاه / خانه‌بهداشت تکمیل و پس از امتیازدهی، هر دو فرم (پرسشنامه ASQ-SE و ASQ-3) به هم پیوست و به کلینیک تخصصی تکامل جهت انجام " تست Bayley " ارجاع شود.

✓ نکته :

برای دستیابی به نتایج صحیح باید از پرسشنامه‌های گروه سنی مناسب، برای غربالگری هر کودک استفاده کرد.

در کودک با سن بارداری کمتر از 37 هفته، تا سن 2 سالگی باید از سن تطبیق یافته، مشابه توضیحات ارائه شده برای ASQ-3 استفاده شود.

✓ گروه‌های سنی و پوشش پرسشنامه‌های ASQ-SE :

1	2 ماهگی	1 ماه و 0 روز تا 2 ماه و 30 روز	6	30 ماهگی	27 ماه و 0 روز تا 32 ماه و 30 روز
2	6 ماهگی	3 ماه و 0 روز تا 8 ماه و 30 روز	7	36 ماهگی	33 ماه و 0 روز تا 41 ماه و 30 روز
3	12 ماهگی	9 ماه و 0 روز تا 14 ماه و 30 روز	8	48 ماهگی	42 ماه و 0 روز تا 53 ماه و 30 روز
4	18 ماهگی	15 ماه و 0 روز تا 20 ماه و 30 روز	9	60 ماهگی	54 ماه و 0 روز تا 72 ماه و 0 روز
5	24 ماهگی	21 ماه و 0 روز تا 26 ماه و 30 روز			

✓ نحوه امتیازدهی ASQ-SE :

گزینه های پاسخ به هر سوال به صورت:

اغلب یا همیشه
گاهی
به ندرت یا هرگز
اگر در مورد این رفتار کودکان نگرانید، علامت بزنید

$$10 = X \quad 5 = V \quad 0 = Z$$

به گزینه «گاهی» و «نگرانی در مورد این رفتار کودک» همواره امتیاز 5 تعلق می‌گیرد.

نهایتاً امتیازات کسب شده در هر پرسشنامه جمع زده شده و با «نقطه برش» اعلام شده برای هر گروه سنی، مقایسه می‌شود

✓ نحوه امتیازدهی نهایی به پرسشنامه های ناقص تکمیل شده-2: ASQ:SE :

1. ابتدا پرسشنامه را از نظر یافتن سوالات بی پاسخ بررسی کنید، اگر همه سوالات پاسخ داده شده بود، اقدامات بعدی را انجام دهید.

اگر سوالاتی بی پاسخ مانده بودند، سعی کنید دلیل آن را بفهمید، در چنین مواردی معمولاً والدین به پاسخ صحیح اطمینان ندارند یا در مورد این که کودک فعالیت مورد نظر را به درستی انجام می دهد یا نه، نگرانی و شک دارند. سعی کنید اطلاعات لازم را از والدین جمع آوری کرده و به سوالات بی پاسخ، پاسخ داده و امتیاز دهید.

در صورتی که به هر دلیل نتوانستید پاسخ سوال را دریافت کنید به صورت زیر عمل کنید

2. اگر 1 یا 2 سوال بی پاسخ مانده است : نیاز به انجام کار خاصی نیست زیرا تفسیر امتیاز را تحت تأثیر قرار نمی دهد پس امتیازدهی نهایی انجام گردد .

3. اگر 3 سوال بی پاسخ مانده است : امتیاز کل به دست آمده از سوالات دارای پاسخ در پرسشنامه را بر تعداد سوالات پاسخ داده شده تقسیم کرده و سپس عدد بدست آمده را بر تعداد سوالات پاسخ داده شده تقسیم و در نهایت عدد به دست آمده را به عدد 3 (تعداد سوالات بدون پاسخ) ضرب کرده و نتیجه را با امتیاز کل بدست آمده از سوالات دارای پاسخ در پرسشنامه، جمع می کنیم

4. اگر 4 سوال یا بیشتر از سوالات پرسشنامه بدون پاسخ مانده بود، دیگر پرسشنامه باطل است و نمی توان امتیاز آن را محاسبه و به آن استناد کرد و مجدد پس از آموزش پرسشنامه تکمیل گردد.

5. در کنار برخی از سوالات امتیازدار پرسشنامه ASQ:SE-2 ، فضایی برای نوشتن نقطه نظرات اضافی والدین وجود دارد. به نقطه نظرات مکتوب والدین در این فضاها توجه و جهت تشخیص رفتارهای طبیعی کودک، از رفتارهای غیرطبیعی موارد زیر را مطالعه کنید :

1- مشکلات غذا خوردن : اگر در این مورد والدین نظراتی بنویسند که نشان دهد در محدوده هنجارهای تکاملی (مناسب سن) کودک است، مثلاً اینکه کودک بد غذا است و فقط غذاهای بخصوصی را دوست دارد، و ضمناً در این مورد ابراز نگرانی خاصی نکرده باشند، در این صورت شما می توانید در مورد رفتارهای طبیعی کودک در زمینه غذا خوردن در این سن خاص، والدین را مطلع گردانید. اما اگر مطالب نوشته شده توسط والدین حکایت از یک رفتار غیرطبیعی و غیر متناسب سن کودک دارند، در آن صورت کودک را می توانید به متخصص مربوطه ارجاع دهید.

2- رفتارهای تکراری و مداوم: هدف از طراحی این سوال پرسشنامه که " آیا کودکان کارهایی را بارها و بارها تکرار می کند و وقتی سعی می کنید متوقفش کنید، ناراحت می شود؟ " به عنوان مثال : " بدنش را به جلو و عقب تاب می دهد، دست هایش را به حالت بال بال زدن بالا و پایین می برد، دور خودش می چرخد، یا ...؟ " ، شناسایی رفتارهای تکراری و مداوم است. ممکن است والدین در این بخش به فعالیت های طبیعی که مورد علاقه کودک بوده و او زیاد انجام می دهد (مانند خواندن کتاب، آواز خواندن، خاله بازی) اشاره کنند و در این مورد ابراز نگرانی خاصی هم نکنند. برای افتراق بین رفتارهای هنجار و طبیعی از غیرهنجار و غیرطبیعی، آزمون گران می توانند با پرسیدن بعضی سوالات از والدین و افتراق دادن این دو از هم گردد.

مثلاً: " چقدر برای کودک شما دشوار است که آن رفتار تکراری را قطع کند؟ " یا " وقتی سعی می کنید کودک خود را از انجام آن رفتار تکراری منع کنید، چه اتفاقی می افتد؟ "

3 : سوالات کلی و باز مندرج در انتهای پرسشنامه در امتیازدهی شرکت ندارند ولی باید به عنوان نشانه های عمومی از نگرانی های والدین مورد بهره برداری قرار گیرند. در صورتی که امتیاز کودک در پرسشنامه ASQ:SE-2 طبیعی بوده است، ارجاع کودک برای بررسی های تکمیلی صرفاً بر اساس ابراز نگرانی والدین در پاسخ به یکی از همین سوالات کلی و باز صورت گیرد.

4 لازم است هر گونه ابراز نگرانی والدین در پرسشنامه ها مورد پیگیری قرار گیرد و اطلاعات لازم در اختیار آن ها قرار گرفته یا ارجاعات لازم متناسب با حیطة مورد نگرانی والدین، صورت گیرد.

5 آخرین سوال مندرج در همه پرسشنامه ها که از والدین در مورد چیزهای لذت بخش مربوط به کودکشان سوال می کند، به والدین اجازه می دهد که پرسشنامه را به صورت مثبت به پایان رسانده و نیز به متخصصین کمک می کند بتواند گفتگو با والدین در مورد نتایج پرسشنامه را از یک نقطه مثبت آغاز کنند.

✓ نقاط برش ASQ-SE :

طبیعی (کمتر از)	منطقه پایش	نیازمند ارجاع (بیشتر از)	گروه سنی (ماه)
30	30-35	35	2
30	30-37.5	37.5	6
40	40-42.5	42.5	12
55	55-60	60	18
55	55-60	60	24
45	45-55	55	30
60	60-65	65	36
60	60-67.5	67.5	48
60	60-70	70	60

سن 2 ماهگی

✓ جهت کودکان سن 2 ماهگی چکار کنیم؟

- برای کودکان 2 ماهه با " وزن تولد 2000 گرم و کمتر " و یا " سن بارداری زیر 34 هفته " و یا به هر دلیلی سابقه‌ی " دریافت اکسیژن " در زمان تولد در بیمارستان باید :

1. سوالات Red Flag سن 2 ماهگی تکمیل شود .
2. پرسشنامه ASQ 3 تکمیل شود
3. پرسشنامه ASQ_SE2 تکمیل شود
4. نهایت با در دست داشتن هر دو پرسشنامه ، ارجاع به مرکز طلوع انجام گردد .

- برای کودکان 2 ماهه با " وزن تولد 2000 تا 2500 گرم " و یا " سن بارداری بین 34 تا 37 هفته " و یا " سابقه بستری در بیمارستان (NICU) :

1. سوالات Red Flag سن 2 ماهگی تکمیل شود .
2. پرسشنامه ASQ 3 تکمیل شود .
3. در صورتی که جواب پرسشنامه ASQ شامل ارجاع شود ، پرسشنامه ASQ_SE2 تکمیل گردد و در نهایت با در دست داشتن هر دو پرسشنامه ، ارجاع به مرکز طلوع انجام گردد .

- جهت کودکان ترم با " وزن تولد بیشتر از 2500 کیلوگرم " و یا " سن بارداری بیشتر از 37 هفته " که شامل هیچ کدام از موارد بالا نمی‌شود :

1. سوالات Red Flag سن 2 ماهگی تکمیل شود .
2. در صورتی که امتیاز سوالات Red Flag مناسب نبود، پرسشنامه ASQ 3 تکمیل شو