

کد سند: ISH/PRO/INC/22
 ویرایش: 0
 تاریخ تصویب: 95/08/20
 تاریخ آخرین بازنگری: 98/08/20
 تاریخ بازنگری بعدی: 99/08/20
 صفحه: /

بیمارستان امام سجاد (ع) اشتیان

فرآیند جداسازی بیمار از ونتیلاتور



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
 بهداشتی درمانی اراک

چک دستور پزشک مبنی بر جداسازی از

استراحت دادن به بیمار به میزان کافی قبل از شروع

از چند ساعت قبل از شروع جداسازی به

مثبت بودن معیارهای جدایی

بیمار به دستگاه پالس کمیته ی وصل

اطلاعات پایه از جمله ضربان قلب- آریتمی- فشارخون به تعداد

شستشو و ضد عفونی کردن

توضیح به بیمار در مورد نحوه

پوزیشن نشسته یا نیمه

انجام فیزیوتراپی تنفسی و در صورت
 لزوم ساکشن داخل تراشه و دهان بیمار را

وسایل مورد نیاز جهت وصل بیمار به اکسیژن

جداسازی از دستگاه

جهت اصلاح حرکات تنفسی و قادر نمودن
 بیمار به تنفس خودبخودی در اولین قدم

به علت تمایل به
 هیپوونتیلیسیون در ضمن
 جداسازی بیمار

در صورتی که از TPicc استفاده می
 کنید قطعه آن را پس از جدا کردن

رابط اکسیژن را به
 محل مخصوصی به TPicc

در صورتی که بیمار
 در تمام طول روز
 قادر به تهویه **

پس از هر مرحله جداسازی بیمار را

اکسیژن را به میزان

گرفتن نمونه گاز خون شریانی از

بیمار را از نظر قدرت

انتقال نمونه به آزمایشگاه توسط

برحسب تحمل بیمار تا حد 30-60 دقیقه زمان

در صورتی که بیمار
 *** تمام طول شبانه
 روز از دستگاه جدا

تصویب کننده:

خی

تایید کننده:

آیا جواب آزمایش قابل
 قبول می باشد؟

تهیه کنندگان

بل

وصل مجدد بیمار به دستگاه تهویه

بیمارستان

تحت نظر قرار دادن بیمار از نظر

نوشتن دستور کتبی وصل مجدد توسط پزشک پس از حضور در بخش

تمام اقدامات و واکنش بیمار

مترن. کنترول
 عفونت. بهبود