

اندیکاسیون های تجویز داروها

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
انسولین	سرپائی ، بستری	فوق تخصص غدد بزرگسال /	دیابت تیپ ۱
	بستری	فوق تخصص غدد اطفال /	دیابت بارداری
	بستری	متخصص داخلی /	بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ که: HbA1C < ۱۰٪ یا mg/dl ۲۵۰ < FBS mg/dl ۳۰۰ < BS یا عالائم بالینی شدید دیابت
		متخصص اطفال /	عدم پاسخ به درمان خوراکی در دیابت نوع ۲
		متخصص زنان و زایمان /	عدم امکان استفاده از داروهای خوراکی کاهنده قند در شرایط خاص بالینی
		پزشک عمومی	دسترسی سریع به کنترل قند خون (DKA) یا (HHS)
			دیابت نوزادی (هیپر گلیسمی) قند خون بالاتر از ۳۰۰-۲۵۰ mg/dl

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
آلبومنین باند	پاکلی تاکسل	سرپائی ، بستری	سرطان پانکراس
		فوق تخصص خون و انکولوژی ،	آدنوکارسینومای متاستاتیک غیر قابل علاج پانکراس
		متخصص رادیوتراپی و رادیوانکولوژی	کارسینومای موضعی غیر قابل علاج پانکراس
			سرطان ریه
			سرطان ریه از نوع غیر سلول کوچک (Non-Small Cell Lung Cancer؛ NSCLC) پیشرفته موضعی
			سرطان ریه از نوع غیر سلول کوچک (Non-Small Cell Lung Cancer؛ NSCLC) پیشرفته متاستاتیک
			سرطان پستان
			شکست شیمی درمانی ترکیبی برای بیماری متاستاتیک
			عود بیماری طی ۶ ماه از شیمی درمانی ادجوانی

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
PGEI	میزوپروستول	بستری / بستری موقت / سرپائی	سقط درمانی به صورت مونوتراپی
		متخصص زنان و زایمان	سقط خود به خودی ناکامل و ناقص در ۳ ماه اول
			سقط ناقص در سه ماهه اول بارداری
			القای زایمان و آماده کردن سرویکس (در هفته ۲۷ بارداری و بالاتر)
			Stillbirth
			مرگ جنین
			آماده کردن سرویکس قبل از انجام پروسیجر (قبل از هفته ۲۰ بارداری)
			پروفیلاکسی PPH

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
Anti-Thymocyte Immunoglobulin (rATG)	بستری / بستری موقت /	اجرای فلوشیپ پیوند کبد / فوق تخصص گوارش / جراح فلوشیپ پیوند کلیه ، قلب / انفرولوژیست / جراح فلوشیپ پیوند ریه و فوق تخصص ریه / فوق تخصص نارسایی قلب	پیوند کبد
			رد پیوند سلولار مقاوم به استروئید
			پیوند روده
			درمان رد پیوند متوسط تا شدید یا موارد مقاوم به استروئید
			پیوند پانکراس
			پیوند ریه
			پیوند قلب

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص تجویز کننده	اندیکاسیون تجویز دارو
انوکسایپارین	بستری / بستری موقت / سرپائی	متخصص داخلی ، متخصص جراحی عمومی، متخصص ارتوپدی، متخصص قلب و عروق، متخصص زنان و زایمان ، و متخصص رادیوانکولوژی، فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال و بزرگسال،متخصص مغز و اعصاب، متخصص اطفال	تعویض مفاصل ران
			تعویض مفاصل زانو
			تعویض مفصل لگن
			شکستگی استخوانهای بزرگ
			جراحی های ماذور ارتوپدی
			تروماتی شدید
			جراحی آرتروسوکوپی زانو
			پروفیلاکسی علیه VTE در بیماران high risk bariatric جراحی
			پروفیلاکسی علیه VTE در بیماران مديکال
			بیماران قبلی دارای دریچه مصنوعی قلب یا سایر اندیکاسیون های دیگر
			پیشگیری از DVT در بیماران کاندید شیمی درمانی
			بارداری
			ترومبوز حاد التهابی مادرزادی یا اکتسابی کودکان
			ترومبوز وریدی در بیماران ایسکمیک استروک
			درمان انواع VTE شامل PE و DVT

نام دارو	محل تجویز دارو	تخصص کننده تجویز	اندیکاسیون تجویز دارو
IVIg	بستری / بستری موقعیت	متخصص داخلی، متخصص عفونی، متخصص نورولوژی، متخصص اطفال، متخصص ارولوژی، متخصص زنان و زایمان و	بیماری میاستنی گراویس قبل از پیوند کلیه و کاندید پیوند نازایی صرع مقاوم کودکان Intractable Childhood Epilepsy سندروم West سندروم Lennox-Gastaut Lambert-Eaton syndrome سندرم گیلن باره نوروپاتی حرکتی چند کانونی Multifocal Motor Neuropathy Anti MAG neuropathy CIDP(Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy) بیماری کاوازایکی لوسی ملوفیتیک مزمن B-cell با هیپوگاماگلوبولینی که دچار عفونت های مکرر می شوند. ITP (Werlhof syndrome) نقص ایمنی هومرال اولیه نقص ایمنی هومرال ثانویه پیشگیری از عفونت باکتریال در بیماران هیپوگاماگلوبولینی ابتلای راجعه به عفونت های باکتریایی مرتبط با B_cell در CLL یا مولتیپل میلوما، لنفوم غیر هوچکین، پیوند مغز استخوان / درمان ایمونوساپرس پیشگیری از عفونتهای باکتریال در گیرندگان آلوئزیک مبتلا به هیپوگاماگلوبولینی ($IgG < 400 \text{ mg/dl}$) که کمتر از ۱۰۰ روز از پیوندشان گذشته است. درمان کربز هایپر همولیتیک مقاوم به سایر درمان ها (مانند کورتیکواستروئیدها) درمان زردی ثانویه نوزاد به بیماری همولیتیک مرتبط با ناسازگاری Rh یا ABO ترومبوسیتوپنی آلو ایمیون نوزادی پلی میوزیت درماتومیوزیت میوزیت نکروزانت به عنوان درمان پیشگیری قبیل و بعد از مواجهه با هپاتیت A پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در شیرخوار زیر ۱۲ ماه پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در زنان بارداری که شواهد ایمنی نسبت به سرخک ندارند پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در افراد یکه نقص ایمنی شدید دارند پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در شیرخواران بالای ۱۲ ماه که منع مصرف نسبت به دریافت واکسن MMR دارند. پروفیلاکسی بعد از مواجهه با سرخک در مادران بارداری که تمایل به سقط جنین ندارند. پروفیلاکسی بعد از مواجهه با واریسلا در صورتیکه ایمونوگلوبولین واریسلا زوستر در دسترس نباشد. درمان سندروم نقص ایمنی هورمونی اولیه آگاماگلوبولینی مادرزادی، سندروم نقص ایمنی شدید combined ایمنی common variable ، نقص ایمنی وابسته به X ، سندروم ویسکوت-آلدریج () درمان آلوایمیونیزاسیون پلاکتی یا پورپورای بعد از تزریق خون

درمان آپلازی مقاوم گلوبولهای قرمز		
درمان سندروم Lambert Eaton		
درمان صرع مقاوم کودکان		
درمان سندروم Orseclum myoclonus		
درمان آسفلالومیلیت حاد منشر شدید (ADEM) که به درمان با گلوکورتیکوئید پاسخ نمیدهدن.		
آسفلالیت اتوایمیون anti-NMDA receptor		
درمان سندروم Stiff-Person در بیمارانیکه که گلوکورتیکوئیدها را تحمل نمیکنند یا به آن پاسخ نمیدهند .		
درمان سندروم (TTP-HUS) عود کننده یا مقاوم به درمان		
پیشگیری از آنوریسم شریان کرونری همراه با سندروم کاوازاكی همراه با آسپرین		
درمان refection هورمونی حاد در بیماران پیوند کلیه به همراه پلاسمافرژیس		
حساسیت زدایی بیماران با حساسیت بالا (PRA>20%) منتظر پیوند کلیه		
درمان نفروپاتی BK در بیماران پیوند کلیه		
درمان نفروپاتی شدید IgA		
درمان (birdshot retinochoroidopathy) یوئیت خلفی اتوایمیون دوطرفه		
درمان ITP ناشی از HIV ، عفونتهای شدید ،		
آنمی ناشی از عفونت parvovirus B19		
درمان بیماریهای CMV (بنومونی، رتینیت) به همراه گانسیکلوروپر در بیمار HIV یا پیوند		
درمان MS عود کننده زمانیکه سایر روشهای درمانی قابل انجام نباشند.		
درمان درماتومیوزیت سیستمیک مقاوم به گلوکورتیکوئید		
پلی میوزیت مقاوم به گلوکورتیکوئید		
درمان واسكولیت مقاوم سیستمیک		
درمان لوپوس مقاوم (SLE)		
درمان adult-onset still disease		
درمان سندروم آنتی فسفولیپید مقاوم		
درمان سندروم استیون جانسون شدید در مراحل اولیه		
درمان نکرولیز توکسیک اپیدرمال نکرولوزیس		
درمان سپسیس شدید در بیماران critically ill که تحت درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف میباشند		
درمان PTLD به همراه شیمی درمانی		
پیشگیری از سقط راجعه خودبخودی		
در بیماران مبتلا به MS در شرایط خاص مثل بارداری و بعد از زایمان		
در بیماران NMOSD در صورت عدم پاسخ به استروئیدها یا بروز عوارض آن		
در بیماران MOGAD در صورت عدم پاسخ به استروئیدها یا بروز عوارض آن		
در نوزادان Alloimmune thrombocytopenia(NCBI)		
نوزادان متولد شده از مادران دچار ITP		
در سندروم ALPS		
در سندروم Evans		
آنمی های حاد همولیتیک اتوایمیون که به استروئید و ریتوکسی مب پاسخ نمی دهند یا نسبت به این درمان ها ممنوعیت دارند		