



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۲۰۶۶۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاونین محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: دستورالعمل و اندیکاسیون مصرف داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران مبتلا به انفلوانزا-دی ۱۴۰۰

با سلام و احترام

در راستای برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا در کشور و با توجه به فصل افزایش بروز بیماری، خواهشمند است موارد زیر به منظور مصرف داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران با تشخیص آنفلوانزا مورد توجه و ابلاغ قرار گیرد:

۱- داروی مذکور می‌تواند هم بعنوان مکمل پروفیلاکسی و هم درمان موارد مبتلا به انفلوانزا بکار گرفته شود.

۲- گروه‌های دارای اولویت مصرف داروی فوق‌الذکر عبارتند از:

- a. بیماران قلبی یا ریوی شدید
- b. بیماران با نقص و یا کاهش ایمنی
- c. افراد با ریسک بالا که به هر دلیل واکسن آنفلوانزا را دریافت نکرده‌اند و هم‌اکنون دچار علائم بیماری می‌باشند و بروز بیماری در آنان با عوارض شدید همراه می‌باشد.
- d. افرادی که مراقبت از بیماران با ریسک بالا را برعهده دارند و واکسینه نشده‌اند و دچار علائم بیماری شده‌اند.

۳- مدت زمان استفاده از داروی اوسلتامیویر بعنوان پروفیلاکسی بمدت ۷-۱۰ روز (یک نوبت در روز) و بعنوان درمان بمدت ۵ روز (دو نوبت در روز) در افراد بزرگسال می‌باشد. مدت درمان بنا به تشخیص پزشک معالج می‌تواند بیشتر از مدت ذکر شده باشد. در کودکان بر اساس جداول دارویی و تعدیل دوز اقدام گردد.

۴- افراد در معرض تماس در کانون‌های آنفلوانزای پرندگان که واکسن آنفلوانزای سالیانه دریافت نکرده‌اند به منظور پیشگیری پروفیلاکسی حداقل بمدت ۱۰ روز تحت درمان پروفیلاکسی با اوسلتامیویر قرار می‌گیرند.

a. افراد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان بلافاصله باید تحت درمان با داروی فوق‌الذکر قرار گیرند.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۳۰۰/۲۰۶۶۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
پیوست: ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

- ۵- پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در صورتی که اقدامات احتیاطی کنترل عفونت را بدرستی رعایت نکرده اند ضروری می باشد بعد از آخرین تماس با فرد بیمار، بمدت ۷-۱۰ روز تحت پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند.
- ۶- گروههای پرخطر در بیماری آنفلوانزای پرندگان(افرادی که در تماس خانوادگی نزدیک و یا ساکنین یک خانه در تماس نزدیک با بیمار مشکوک یا تایید شده آنفلوانزای پرندگان ، محیط و پرندگان آلوده به آنفلوانزا می باشند)، بلافاصله در اولین فرصت باید داروی اوسلتامیویر را دریافت نمایند.
- ۷- گروههای با خطر متوسط و خطر کم در صورت نیاز و با نظر پزشک معالج ، درمان برای آنها شروع خواهد گردید(راهنمای کشوری مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا- از انتشارات وزارت متبوع)
- ۸- افراد در معرض خطر و یا در معرض تماس بیماری آنفلوانزا در صورت بروز علایم باید بلافاصله با تشخیص پزشک معالج تحت درمان یا پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند. این گروه شامل موارد زیر می باشد:

سالمندان، ساکنین آسایشگاهها و کارکنان آن، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، بیماران مبتلا به بیماریهای مختل کننده سیستم تنفسی، خانم های بارداربالاخص در سه ماهه دوم و سوم بارداری، کودکان و نوجوانانی که تحت درمان طولانی مدت با ترکیبات سالیسیلات قرار دارند ، کارمندان مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، نیروهای درمانی ارائه کننده خدمات درمانی در منزل

دکتر کمال حیدری
معاون بهداشت